

MUCOREX[®]

(AMBROXOL CHLORYDRATE à 15mg/5ml. DCI)

Solution buvable Flacon de 150 ml

Sans Sucre

Expectorant mucolytique
Solution buvable

N° Enreg : 07 / 20D064 / 073



1) Forme et présentation:

Solution buvable.

Flacon de 150 ml.

5 ml de solution buvable = 1 cuillerée à café = 15 mg de principe actif.

2) Composition:

Ambroxol chlorhydrate (DCI)0,300 gr

Excipients : Glycérol, Sorbitol 70%, Acide citrique monohydraté,
Parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle, Arôme de banane,
EauQ.S.P.....100 ml

3) Propriétés :

Expectorant mucolytique.

4) Indications :

Ce médicament est préconisé :

- Dans les états d'engorgement accompagnant les bronchites aiguës, ainsi que certaines affections de l'appareil respiratoire.
- Episodes aigus de broncho-pneumopathies chroniques.

5) Contre-indications :

Réaction d'hypersensibilité à l'un des constituants.

6) Précautions d'emploi :

L'association d'un muco-modificateur bronchique avec un antitussif et/ou des substances asséchant les sécrétions (atropiniques).

Ne pas prendre de médicaments antitussifs durant la période de traitement par l'Ambroxol.

7) Grossesse et allaitement :

Grossesse

Absence d'effet tératogène chez l'animal. En clinique, il n'existe pas actuellement des données suffisamment pertinentes pour évaluer un effet malformatif ou fœtotoxique du chlorhydrate d'Ambroxol lorsqu'il est administré pendant la grossesse.

En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le chlorhydrate d'Ambroxol pendant la grossesse.

Allaitement

En cas d'allaitement, l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée.

8) Effets indésirables:

Possibilité de survenue de troubles gastro-intestinaux mineurs à type de nausées, vomissements, gastralgies, diarrhée. Aussi : Erythème, Rash, Urticaire, Réaction anaphylactique (très rare), Céphalée (très rare), Vertige (très rare), cédant rapidement à la diminution de la posologie.

9) Mode d'emploi et posologie:

Voie orale.

Réservé à l'adulte.

La posologie moyenne du chlorhydrate d'Ambroxol est de 90mg par jour en deux prises.

Soit une cuillère à soupe, deux fois par jour.

10) Pharmacodynamie:

L'Ambroxol possède des propriétés mucokinétiques et expectorantes.

Il stimule par son action les cellules sécrétrices, la sécrétion bronchique et favorise la production d'un mucus plus mobilisable.

Il augmente l'activité ciliaire.

11) Conditions de délivrance:

Ce médicament est délivré sur ordonnance.

Liste II (Tableau C)

12) Conditions de conservation:

A conserver à l'abri de la chaleur.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Médicament enregistré sous le N° : 07 / 20D064 / 073

