CAPTOPRIL LS®

Captopril 25 mg et 50 mg

FORME ET PRESENTATION
CAPTOPRIL LS 25 mg comp sécables boite de 30 comprimés.

COMPOSITION
Captopril (DCI) ..... 25 mg
ou ..... 50 mg
Excipients ..... qsp 1 comprimé

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
- L'hypertension artérielle,
- L'insuffisance cardiaque congestive,
- L'infarctus du myocarde débutant, quand le médecin juge que l'état du patient le permet,
- Les suites de l'infarctus du myocarde, quand le médecin juge que l'état du patient le permet,
- L'atteinte rénale au cours du diabète insulino-dépendant (néphropathie diabétique).

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Allergie à ce médicament ou à l'un des excipients ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine.
- 2ème et 3ème trimestres de grossesse (6 derniers mois de grossesse).
- En cas de traitement concomitant par certains diurétiques, par les sels de potassium, par l'estramustine ou par le lithium, sauf Avis contraire de votre médecin;
- En cas de rétrécissement (sténose) des deux artères rénales ou rein unique, sauf avis contraire de votre médecin;
- En cas d'hyperkaliémie (excès de potassium), sauf avis contraire de votre médecin.

MISES EN GARDE
- Une toux sèche, une réaction allergique avec œdème de la face peuvent survenir sous traitement.
- Ce médicament peut entrainer des risques de réactions allergiques chez les patients sous hémodialyse.
- Au cours de l'infarctus du myocarde, ce médicament doit être débuté à l'hôpital sous surveillance médicale stricte.

PRECAUTION D'EMPLOI
Ce médicament doit être utilisé avec précaution en cas de :
- Régime sans sel stricte ou de traitement diurétique prolongé.
- Chez certains patients, la posologie sera adaptée : insuffisant rénal , sujet âgé, insuffisant cardiaque sévère, diabétique insulinodépendant.
- Ce médicament ne peut être utilisé chez l'enfant que lorsque le traitement aura été institué en milieu hospitalier, sous surveillence particulière.
- En cas d'intervention chirurgicale, prévenir l'anesthésiste de la prise de ce médicament.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
La découverte d'une grossesse sous CAPTOPRIL LS nécessite absolument l'arrêt du traitement. Dans ce cas prévenir le médecin chargé du suivi de la grossesse.
Prévenir également le médecin en cas d'allaitement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre médicament en cours à votre médecin ou à votre pharmacien, et notamment le lithium, les sels de potassium, un diurétique épargneur de potassium, l'astémizole , le bèpridil, l'érythromycine par voie intraveineuse.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
POSOLOGIE
- Elle est variable selon l'affection traitée, et adaptée à chaque patient.
- L'hypertension artérielle : la posologie habituelle recommandée est de 50 à 100 mg/jour.
- Insuffisance cardiaque congestive : la posologie initiale doit être faible, la posologie habituelle recommandée est de 50 à 100 mg/jour.
- Infarctus du myocarde débutant : la posologie initiale est instituée en milieu hospitalier, elle doit être faible , dose recommandée 100 mg/jr.
- Les suites de l'infarctus de myocarde : le traitement sera initié à l'hôpital. la posologie habituelle recommandée est de 75 à 150 mg/jr en 2 ou 3 prises.
- Néphropathie diabétique : la posologie usuelle recommandée est de 50 à 100 mg/jr.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Voie orale. Le comprimé est à avaler avec un verre d'eau.
CAPTOPRIL LS peut être pris avant, pendant ou après les repas.

SURDOSAGE
L'hypotension est l'événement le plus probable, en cas de surdosage . Dans ce cas allonger le patient, jambes relevées. Alerter immédiatement votre médecin.

CONDITIONS DE CONSERVATION
A conserver à une température inferieure à 25 °C, dans l'emballage extérieur , à l'abri de l'humidité.
Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.

CONDITION DE DELIVRANCE
Liste I
DE N° : 08/06E 052/231
08/06E 053/231

DATE DE MISE A JOUR : Février 2017

D.E N° 08/06E 052/231

D.E N° 08/06E 053/231

LABORATOIRES SALEM
Détenteur de la DE , Fabricant , Conditionneur :
LABORATOIRES SALEM – Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE
www.labosalem.com



كابتوبريل ل س

كابتوبريل 25 مغ و 50 مغ

شكل و تقديم
كابتوبريل (ت د م) ..... 25 مغ
أو ..... 50 مغ
سواغ ..... ك ك ل 1 قرص واحد

متى يستعمل هذا الدواء
إن هذا الدواء يستعمل في الحالات التالية :
- ارتفاع الضغط الدموي.
- قصور في وظيفة القلب.
- بعد الإصابة بانسداد نسيج القلب العضلي إذا سمح الطبيب بذلك.
- أمراض الكلى لدى مرضى السكري الذين يتعاطون الأنسولين.

متى لا يستعمل هذا الدواء
إن هذا الدواء لا يستعمل في الحالات التالية :
- فرط الحساسية للكابتوبريل او احد مكونات هذا الدواء أو كابح الإنزيم لتحويل مادة الانجيوتانسين.
- فترة الثلاثي الثاني و الثالث من الحمل (6 أشهر الأخيرة من الحمل).
- في حالة العلاج المتزامن مع بعض مدرات البول، أملاح البوتاسيوم، استراموستين أو الليثيوم، الا في حالة وصف من طرف الطبيب المعالج.
- حالة تقلص المسالك البولية أو وجود كلية واحدة إلا في حالة توصية من طرف الطبيب المعالج.
- حالة ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، إلا في حالة توصية من طرف الطبيب المعالج.

تحذيرات
- سعال جاف، حساسية، و وذمة في الوجه قد تحصل عند تعاطي هذا الدواء.
- حالات حساسية عند المرضى الذين يستعملون تصفية الكلى.
- في حالة الإصابة بانسداد في نسيج القلب العضلي يجب أن يبدأ العلاج في المستشفى تحت رقابة طبية صارمة.

احتياطات الاستعمال
يستعمل هذا الدواء بحذر شديد في الحالات التالية :
- حمية بدون ملح و عند المرضى الذين يتعاطون أدوية المدرات البولية و لمدة طويلة.
- عند بعض المرضى، المقادير يجب أن تدرس مع حالتهم : مرضى القصور الكلوي، كبار السن، مرضى القصور في وظيفة القلب و مرضى السكري الذين يتعاطون الأنسولين.
- لا يعطى هذا الدواء للأطفال إلا في حالة تواجدهم بالمستشفى و تحت رقابة طبية صارمة.
- في حالة القيام بعملية جراحية يجب إبلاغ الطبيب المخدر بأنكم تتناولون هذا الدواء.

الحمل و الرضاعة
عند اكتشاف حمل عند المرأة التي تتعاطى الكابتوبريل ل س يجب إيقاف الدواء فورا و إعلام الطبيب المعالج بذلك. و كذلك إعلام الطبيب المعالج بالنسبة للمرأة المرضعة.

تفاعلات دوائية و تفاعلات أخرى
لتجنب تفاعلات مع أدوية أخرى، يجب إبلاغ طبيبكم أو الصيدلي بأي علاج تتناولونه خاصة الليثيوم، أملاح البوتاسيوم، المدرات البولية ، الاستيميزول ، البيبريديل و الاريتروميسين عن طريق الوريد.

كيف يستعمل هذا الدواء
المقادير :
تختلف المقادير حسب نوع الإصابة و حسب المريض نفسه :
- ارتفاع ضغط الدم: المقدار العادي الموصى به هو 50 إلى 100 مغ في اليوم.
- عجز احتقاني في وظيفة القلب:الجرعة الابتدائية يجب ان تكون ضعيفة و المقدار العادي الموصى به هو 50 إلى 100 مغ في اليوم.
- بداية الانسداد بنسيج القلب العضلي، الجرعة الابتدائية يجب ان تعطى في المستشفى و تكون ضعيفة و المقدار العادي الموصى به هو 100 مغ في اليوم.
- بعد الإصابة بانسداد بنسيج القلب العضلي : يبدأ العلاج في المستشفى و المقدار العادي الموصى به هو من 75 الى 150 مغ في اليوم موزعة على 2 إلى 3 مرات.
- مرض الكلى بسبب داء السكري : المقدار العادي الموصى به هو من 50 الى 100 مغ في اليوم

طريقة الاستعمال
عن طريق الفم يبلع القرص كما هو مع كاس من الماء. كابتوبريل ل س يمكن له أن يؤخذ قبل، أثناء أو بعد الأكل.

الإفراط في الجرعة
انخفاض في ضغط الدم هي الحالة الأكثر حدوثا و الأكثر احتمالا عند تناول جرعات قوية في هذه الحالة يجب تمديد المريض مع رفع رجليه إلى الأعلى في انتظار إخبار الطبيب .

شروط الحفظ
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°م في التعبئة الأصلية بعيدا عن الرطوبة. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

شروط الاستطباب
قائمة I
مقرر التسجيل رقم : 052/231 08/06E
مقرر التسجيل رقم : 053/231 08/06E
تاريخ تحديث النشرة : فيفري 2017

ر.م.ت 052/231 08/06E

ر.م.ت 053/231 08/06E

حامل مقرر التسجيل، مصنع، معبئ :
مخابر سالم – م.ص. 19600 العلمة – الجزائر
www.labosalem.com

صندوق من الورق المقوى فارغة
إعادة تدوير

لوحة من البلاستيك الفارغة
للرمي

فرز النفاية والتغليف الخاصة بك

الأدوية غير المستخدمة
ترد للصيدلية