

COLCHIMED® 1mg Comprimé

Colchicine

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Composition: (par comprimé)

COLCHIMED® 1mg	
Principe actif	Colchicine
Dosage	1 mg
Excipients	Cellulose microcristalline ph 102, lactose DCL11SD, Carboxyméthyl amidon sodique, Stéarate de magnésium.....Q.S.P 1 comprimé
Excipients à effet notable : lactose.....83mg/Comprimé	

FORME PHARMACEUTIQUE :

Comprimé blanc, Boîte de 20 comprimés

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antigoutteux
Anti-inflammatoire

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est préconisé dans:

- Le traitement et la prévention des crises de goutte.
- autres accès aigus microcristallins.
- La maladie périodique,
- La maladie de Behçet,

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais COLCHIMED® 1mg, dans les cas suivants :

- Maladie rénale grave.
- Maladie grave du foie.
- Traitement par des antibiotiques comme la pristinamycine ou ceux de la famille des macrolides (telithromycine, azithromycine, clarithromycine, dirithromycine, erythromycine, josamycine, midecamycine, roxithromycine, troleandomycine, spiramycine).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES

MISES EN GARDE SPÉCIALES :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose ou au galactose, un déficit en lactase de Lapp, un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose, ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

La prise concomitante de colchicine avec certains antibiotiques est contre-indiquée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de traitement au long cours, surveiller la formule sanguine régulièrement.

En cas de maladie du foie et du rein, CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS

Associations contre-indiquées :

+ **Macrolides** (telithromycine, azithromycine, clarithromycine, dirithromycine, érythromycine, josamycine, midecamycine, roxithromycine, troleandomycine, spiramycine).

Augmentation des effets indésirables de la colchicine aux conséquences potentiellement fatales.

+ Pristinamycine :

Augmentation des effets indésirables de la colchicine aux conséquences potentiellement fatales.

Associations déconseillées :

+ Ciclosporine

Risque d'addition des effets indésirables neuromusculaires et augmentation de la toxicité de la colchicine avec risque de surdosage par inhibition de son élimination par la ciclosporine, notamment en cas d'insuffisance rénale préexistante.

+ Vérapamil

Risque de majoration des effets indésirables de la colchicine, par augmentation de ses concentrations plasmatiques par le vérapamil.

+ Inhibiteurs de protéases boostés par ritonavir

Augmentation des effets indésirables de la colchicine, aux conséquences potentiellement fatales.

+ Telaprevir

Risque de majoration des effets indésirables de la colchicine, par diminution de son métabolisme, en particulier chez l'insuffisant rénal et hépatique.

+ Inhibiteurs puissants du CYP3A4 :

telle que l'itraconazole, kétoconazole, posaconazole, voriconazole, quinidine, lidocaïne, amiodarone, simvastatine, atorvastatine, lovastatine, nifédipine, nitrendipine, nimodipine, amlodipine, felodipine, verapamil, diltiazem, rifampicine, clarithromycine, erythromycine, amprenavir, saquinavir, indinavir, nelfinavir, midazolam, trazolam, amiodarone, verapamil, diltiazem

Risque de majoration des effets indésirables de la colchicine, par augmentation de ses concentrations plasmatiques par l'inhibiteur.

Associations faisant l'objet de précautions d'emploi

+ Antivitamines K

Augmentation de l'effet de l'antivitamine K et du risque hémorragique. Contrôle plus

GROSSESSE ET ALLAIT

Grossesse :

En cas de grossesse, le traitement si la pathologie le justifie.

Allaitement :

La colchicine passe dans le lait. Sachant que le pic de colchicine prise du médicament et diminué conseillé de prendre le traitement

POSOLOGIE

Accès aigu de goutte

Les prises de COLCHIMED® p

sans dépasser 1 mg de colchicine

En cas de traitement précoce, d

peuvent être utilisées pour le 1

Ne pas dépasser :

· 3 mg de colchicine le 1er jour

· 2 mg de colchicine les 2ème et

· 1 mg de colchicine le 4ème jour

Réduire la posologie en cas de c

Prophylaxie des accès aigus d

1 mg de colchicine par jour.

Autre accès aigus microcristal

1 mg de colchicine par jour.

Dans tous les cas, respecter strict

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Ce médicament doit être admini

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, CONSULTER

UN CENTRE ANTI-POISON (C

même si votre état ne semble pas

Instructions en cas d'omission d'

En cas d'oubli, négliger la prise

pas doubler la dose.

LES EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, COLCHIMED®

d'avoir des effets indésirables, bi

· Troubles digestifs (diarrhées, na

cutanées.

· Exceptionnellement: troubles s

· Azospermie (absence de sperm

neuro-musculaires réversibles à

CONDITION DE CONSEIL

A conserver à une température inf

Ne pas dépasser la limite d'utilis

CONDITIONS DE DÉLIVR

Liste I, sous ordonnance médicale

PRESENTATION ET NUM

Spécialités	Prés
COLCHIMED® 1m	Boîte

Ceci est	
- Un médicament est un produit non-conforme aux prescriptions	
- Respectez rigoureusement l'ordonnance	
- Votre médecin et votre pharmacien	
- N'arrêtez pas de votre propre initiative	
- Ne pas répéter la même prescription	

Gardez les médicaments

Fabricant est titulaire de
Siège Sociale : 08, rue
Usine et conditionneur : Sidi Ka