

# Pentoxifylline

MYLAN

30 comprimés pelliculés à libération prolongée

voie orale

MyLAN

L.P. 400 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

La substance active est : pentoxifylline (400 mg)

Les autres composants sont : hydroxyéthylcellulose, povidone, talc, stéarate de magnésium.

Pellucilage : polymère de polyacrylate à 30%, hypromellose, talc.

Liste II.

Titulaire - Exploitant - Fabricant :

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

D.E. n° 09/06J 105/450

Qu'est-ce que Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?

Comprimé pelliculé à libération prolongée. Boîte de 30 comprimés. Ce médicament est un vasodilatateur périphérique.

Il est indiqué dans :

- le traitement des symptômes de l'artérite des membres inférieurs (*maladie des artères des jambes entraînant des crampes douloureuses à la marche*).
- les troubles neurologiques mineurs liés au vieillissement.

Informations nécessaires avant de prendre Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Ne pas prendre Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée en cas de :

- phase aiguë de l'infarctus du myocarde,
- antécédents d'allergie à l'un des composants du comprimé,
- lorsqu'une hémorragie est en cours ou s'il existe un risque hémorragique majeur.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse et l'allaitement.

Prendre des précautions particulières avec Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Ce médicament peut augmenter les risques de saignements dans certaines situations :

- en cas de chirurgie récente, ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, ou de maladie grave du foie,
- en cas d'association à un médicament destiné à éviter la formation de caillot dans un vaisseau : traitement anticoagulant,
- en cas de diabète (*une surveillance ophtalmologique est nécessaire*).

Suivez rigoureusement les conseils de votre médecin en matière de surveillance et prévenez-le de l'apparition du moindre saignement.

Si vous avez des antécédents d'hypotension artérielle ou si vous prenez un médicament pour l'hypertension artérielle, faites surveiller plus A.091039-A

souvent votre tension artérielle.

Ce médicament est éliminé par les reins, signalez à votre médecin vos antécédents rénaux et urinaires.

Ce médicament doit généralement être utilisé avec précaution si vous souffrez d'angine de poitrine sévère.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament est principalement utilisé chez le sujet âgé pour lequel le risque de grossesse est absent.

Néanmoins, son utilisation est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien, si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?

La posologie usuelle est de 1 à 3 comprimés par jour.

Chez l'insuffisant rénal, la posologie maximale est de 2 comprimés par jour.

Voie orale.

Avaler le comprimé sans le croquer, avec un peu d'eau.

Prendre le comprimé de préférence, au cours du repas.

Si vous avez l'impression que l'effet de Pentoxifylline Mylan

L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas d'absorption massive, prévenir immédiatement un médecin.

Si vous oubliez de prendre Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre. Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- troubles digestifs : nausées, vomissements, brûlures gastriques, diarrhée. Prenez le médicament au cours des repas pour éviter ces effets,
- accès de rougeur du visage, chute de tension, maux de tête, vertige, insomnie, agitation,
- éruption cutanée, démangeaisons ou réactions allergiques,
- augmentation du risque de saignement surtout en cas de prise concomitante de médicament destiné à éviter la formation de caillot dans un vaisseau,
- anomalies de certaines constantes biologiques dans le sang,
- exceptionnellement, la membrane du comprimé peut être retrouvée dans les selles.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Comment conserver Pentoxifylline Mylan L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée ?

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C, dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Date de révision de la notice : 09/2007

NOT577A