

Lipanon® 100 mg

apiofibrate gélule

SANOFI

un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Précautions d'emploi

- La prise de ce médicament ne dispense pas du régime et sa poursuite régulière est toujours indispensable. Un bilan sanguin régulier est nécessaire.
- L'utilisation chez l'enfant nécessite une surveillance médicale particulière.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS AINSI QU'ÉVÉNEMENT ANORMAL EN COURS DE TRAITEMENT À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN, notamment si vous prenez un médicament anticoagulant ou une statine (autre médicament abaissant le cholestérol).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

La prise de ce médicament est déconseillée en cas de grossesse. En cas de découverte fortuite d'une grossesse alors que vous prenez ce médicament, il convient de l'arrêter. Contactez alors votre médecin traitant.

Allaitement

Par manque de données concernant le passage dans le lait, et dans le cas où ce traitement apparaît réellement nécessaire après l'accouchement, l'allaitement est déconseillé.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de LIPANON
LIPANON contient du lactose monohydraté.

3. COMMENT PRENDRE Lipanon

Posologie

La posologie est de 1 gélule par jour. Cette posologie ne doit pas être dépassée. Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Durée du traitement

- En association avec le régime, ce médicament constitue un traitement symptomatique devant être prolongé et régulièrement surveillé.
- Pour une bonne utilisation, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière, qui comporte des dosages sanguins réguliers des enzymes du foie (transaminases) la première année de traitement.

Si vous avez plus pris de LIPANON que vous n'auriez dû
Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin.

Si vous oubliez de prendre LIPANON
Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin.

- في هذه النشرة
1. ما هو ليبانون، وفي أية حالات يستعمل
 2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ليبانون
 3. كيف يؤخذ ليبانون
 4. ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة
 5. كيف يحفظ ليبانون
 6. معلومات إضافية

في حال ما هو ليبانون، وفي أية حالات يستعمل ؟
يستخدم ليبانون في فئة دوائية تسمى فibrates تستعمل هذه الأدوية لإنقاص مستوى الشحم في الدم، مثل الشحم السميعة ثلاثي الغليسريد.

يستعمل ليبانون كإجراء مكمل لنظام غذائي قليل الدهون وللتدابير العلاجية أخرى غير دوائية مثل التغييرات الغذائية ونظام الوزن من أجل إنقاص مستوى الشحم في الدم.

2 ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول ليبانون
في حال أنك طبيبك عن عدم تمتك بعض أنواع السكر، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناولوا أبداً ليبانون في الحالات التالية:
• الحساسية المفرطة للمادة الفعالة أو لأحد الأيسر مكونات الدواء، • الفصور الكبدية،
• الفصور الكلوية، • مشاركة مع علاج خافض للكوليسترول آخر من نفس الفئة (هيبوات)،
• احذوا من ليبانون

تحذيرات خاصة
في حالة ظهور آلام عضلية، اطلب فوراً طبيبكم المعالج (راجع "ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة") اطلب طبيبكم في حال كنت تشكو من مرض في الغدة الدرقية.

• سوف تخضع لإجراء فحص لوظائف الكبد قبل بدء العلاج وبانتظام خلال السنة الأولى من العلاج، • ينصح بعدم استعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو من نقص أنزيم اللاكتاز، • ppp أو من تناول سواه من أمصاص اللينوكوز والغالكتوز (أمراض وراثية نادرة).

احتياطات الاستعمال
لا تتناولوا هذا الدواء إلا بعين من النظام الغذائي ومن ضرورة مراعته بانتظام من الضروري القيام بانتظام بفحص الدم.

• الاستعمال لدى الأطفال يستوجب مراقبة طبية خاصة.
تناولوا أو استعمالوا الأدوية أخرى

من أجل تفادي حصول تفاعلات محتملة بين عدة أدوية، يجب بانتظام إبلاغ طبيبكم أو الصيدلاني عن كل علاج قيد التناول وعن كل طائفة غير طبيعية خلال فترة العلاج، خصوصاً في حال كنت تستعمل دواء مضاداً للحفظ أو من فئة المضادات الحيوية (دواء آخر خافض للكوليسترول) في حال كنت تأخذ أو قد أخذت مؤخراً دواءً آخر، بما في ذلك أدوية حصلت عليه من دون وصفة طبية، اطلب طبيبكم أو الصيدلاني بذلك.

الفصل والإرضاع
لا ينصح بتناول هذا الدواء خلال فترة الحمل في حال اكتشفتم صفة أثناء العلاج بهذا الدواء، بما في ذلك إرضاع طفلك، في حال كنتم تتناولون، اتصلوا بطبيبكم المعالج، الإرضاع

بسبب عدم وجود معلومات تتعلق بمرور الدواء في حليب الأم، وفي حال كان يبدو ضرورياً تناولوا هذا العلاج بعد الولادة، لا ينصح بالإرضاع استثنائياً طبيبكم أو الصيدلاني قبل تناولها أي دواء.

معلومات عامة تتعلق ببعض مكونات ليبانون.
يعتني ليبانون على لاكتوز أحادي التيه.

3 كيف يؤخذ ليبانون
المقادير، الفطار هو كبسولة واحدة في اليوم، يجب عدم تجاوز هذا المقدار، في جميع الحالات، يجب التقيد تماماً بوصفة طبيبكم.

طريقة الاستعمال: عن طريق الفم.
فقط تناولوا الدواء يجب التقيد تماماً بوصفة طبيبكم.

مدة العلاج
• بالمشاركة مع النظام الغذائي، يشكل هذا الدواء علاجاً للأعراض يستوجب معالجة طويلة المدى ومراقبة منتظمة.

• استعمال سليم، فإن من الضروري المتابعة خلال السنة الأولى من العلاج لمراقبة طبية منتظمة تتضمن معايرة منتظمة لأنزيمات الكبد (بما في ذلك الأمين) في الدم.

• لا تتناولوا أكثر مما يجب من ليبانون، لا تتروا باستشارة طبيبكم، في حال نسيتم تناول ليبانون، لا تتروا باستشارة طبيبكم.

4 ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة
مثل كافة الأدوية، يمكن ليبانون أن يسبب تأثيرات غير مرغوبة، لكنها لا تحدث بصورة منتظمة لدى الجميع.

هذه التأثيرات أو مفعولها غير الشروع وغير خطيرة:
• اضطرابات هضمية أو معدية أو معدية مثل عسر الهضم، الغثبان، التقيؤ، الإسهال، صداد، دوار، حالات نادرة من الغثبان، • ارتكاسات جلدية، حكة، طفح، بثور، بشكل استثنائي، لآلئ جلدية عند التعرض للشمس أو لأشعة فوق البنفسجية، خاصة (تساقط الشعر)، • ارتفاع عابر لنسبات الأمين (أنزيمات الكبد)، • بعض حالات العجز الجنسي، • بعض حالات متفرقة من أمراض الرئة، • ألم في العضل (مع ارتفاع الأنزيمات العضلية أحياناً).

في حال شعرت بالألم عضلية أو بإحساس عضلي أو بوهن عضلي، اتصل فوراً بطبيبكم، لأن الاضطرابات العضلية يمكن أن تكون خطيرة في حالات نادرة.

في حال ملاحظة تأثيرات غير مرغوبة لم يتم ذكرها في هذه النشرة، أو في حال تقادم بعض التأثيرات غير المرغوبة، اطلب طبيبكم أو الصيدلاني بذلك.

5 كيف يحفظ ليبانون
يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وعن مجال بصريهم.

يجب عدم استعمال ليبانون بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة. يحفظ هذا الدواء في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

يجب عدم رمي الأدوية بتأتا في البحر أو في النفايات المنزلية. أسأل الصيدلاني عما يجب فعله بالأدوية غير المستعملة. هذه التدابير تسمح بحماية البيئة.

6 معلومات إضافية
عنا معلومات ليبانون، المادة الفعالة في

تتكون من مقادير على شكل حبيبات مكونة من 100 ملغ كبسولة واحدة.

المكونات الأخرى هي: نشا الذرة، لاكتوز أحادي التيه، غلاف الكبسولة، جلايسين ثنائي كبريت، التيتانيوم (E171)، كبريتيد الحديد (E172)، كبريتيد الحديد الأسود (E172).

ما هو ليبانون ومحتوى النقيض: كبسولة، عليه من 30 حامل رقيقة التسوية والنموذج: sanofi-aventis France

1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

الصانع: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge - Ambarès et Lagrave 33565 Carbon Blanc - France

التاريخ الأخير: تم فيه تعديل هذه النشرة هو يونيو 2012

إِنْ هَذَا الدَّوَاءُ مستحضر يورث على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتضمنة عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

• الطبيب والصيدلي هما الجواب عن الدواء وفي نفعه وضرره.

• لا تطعم نساء الحمل الحنونة لك من تلقاها نفسك.

• لا تذكر صروف أرباحك بدون استشارة الطبيب.

• لا تتروا الأدوية في متناول الأطفال.

• تحفظ وزارة الصحة العرب والحد الصيدالية العرب.

THIS MEDICAMENT Is a product, which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you. Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.

• The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.

• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed.

• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

• Keep all medications out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers, Union of Arab Pharmacists.