TAHOR® 10 mg

ATORVASTATINE

Comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Atorvastatine calcique trihydratée correspondant à atorvastatine 10 mg.

Excipients : carbonate de calcium, cellulose microcristalline, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, polysorbate 80, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium, opadry blanc YS-1-7040, émulsion anti-mousse, cire de candellila, q.s.p. un comprimé pelliculé.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant/inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un hypocholestérolémiant qui abaisse la quantité de cholestérol dans votre sang. Il est habituellement prescrit lorsque les activités physiques, la perte de poids et les modifications de votre régime alimentaire n'ont pas permis d'abaisser suffisamment ce taux de cholestérol.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de certaines hypercholestérolémies, lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant.

La poursuite du régime est toujours indispensable.

Ce médicament est également préconisé dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales en addition ou non à d'autres traitements.

Il est également indiqué en :

- Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec 3 facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée.
- Prévention des événements coronaires et cérébrovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans hyperlipidémie associée.

La poursuite du régime est toujours indispensable.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament **ne doit pas être utilisé** dans les cas suivants :

- allergie connue à l'un de ses composants (voir composition),
- affection hépatique en cours d'évolution, augmentation prolongée des enzymes du foie,
- en cas d'association à l'itraconazole, kétoconazole (médicaments traitant certaines infections à champignons), aux antiprotéases, à la delavirdine (traitements d'une infection par le VIH),
- chez la femme qui allaite (cf. Grossesse –allaitement).

Ce médicament **ne doit généralement pas être utilisé,** sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'association à un autre médicament prescrit pour le cholestérol, un fibrate (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions).

MISES EN GARDE SPÉCIALES

• Dans le traitement des hypercholestérolémies, le respect scrupuleux du régime alimentaire prescrit par le médecin est indispensable.

• Un bilan hépatique sera effectué avant traitement et régulièrement sous traitement.

• En cas de douleurs musculaires, prévenir immédiatement votre médecin traitant (cf. rubrique Effets non souhaités et gênants).

• En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et de galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament **avec précaution** dans le cas suivant :

• si vous consommez d'importantes quantités d'alcool ou si vous avez eu une maladie hépatique.

La consommation du jus de pamplemousse doit être évitée.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est particulièrement important que votre médecin sache si vous prenez un fibrate (un autre médicament qui baisse le cholestérol sanguin), ou si vous êtes traité pour une infection due à un champignon ou au VIH.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament n'a pas d'indication pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

En cas de désir de grossesse ou si vous souhaitez allaiter votre enfant, prévenez votre médecin.

L'atorvastatine passant dans le lait maternel, ce traitement ne doit pas être utilisé si vous allaitez.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lactose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

La posologie usuelle est de 10 mg voire 20 mg par jour.

Si nécessaire, la posologie peut être augmentée jusqu'à 80 mg par jour au maximum.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

A prendre en une seule fois (indifféremment avant, pendant ou après le repas).

DURÉE DU TRAITEMENT

En association avec le régime, ce médicament constitue un traitement devant être très prolongé et régulièrement surveillé. Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière, qui comporte des contrôles sanguins réguliers du cholestérol.

Les enzymes du foie (transaminases) seront aussi surveillés régulièrement.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout médicament, ce produit, peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

• Pour la plupart, les effets signalés ont été légers et de courte durée : troubles digestifs (constipation, sensation de gonflement, mauvaise digestion, douleurs abdominales, nausées, diarrhée), céphalées (maux de tête), fatigue, insomnie, manifestations allergiques, (urticaire, oedème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou),

• Des douleurs ou crampes musculaires (avec parfois augmentation des enzymes musculaires) ont été rapportées,

• Ont également été observés :

- troubles cutanés (démangeaisons, éruption étendue), chute des cheveux ou des poils,
- signes neurologiques : fourmillements, neuropathie périphérique (atteinte des nerfs des membres),
- atteinte du foie (augmentation des enzymes du foie, hépatite, jaunisse) ou du pancréas (pancréatite), perte d'appétit, vomissements,
- impuissance,
- douleurs articulaires.

• Exceptionnellement ont été observées :

- des tendinopathies (atteinte des tendons).

Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire douloureuse ou une faiblesse musculaire, contactez immédiatement votre médecin car les problèmes musculaires peuvent être graves dans de rares cas.

- Augmentation possible de certains enzymes du foie,
- quantité excessive ou insuffisante de sucre dans le sang,
- quantité insuffisante de certains éléments du sang (plaquettes) jouant un rôle important dans la coagulation sanguine.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

PRÉSENTATION

• Modèle ville : Boîte de 28 comprimés pelliculés.

Liste I - Uniquement sur ordonnance.