Madécassol®

1% CRÈME
Hydrocotyle

400020841
7914**2120**/0208EXFR

COMPOSITION

HYDROCOTYLE* (*Centella asiatica; extrait sec reconstitué titré à 40% d'asiaticoside et 60% d'acides madécassique et asiatique) ..... **1 g**
Excipients : palmitostéarate d'éthylèneglycol (mono et diesters), propylèneglycol, paraffine liquide, huile essentielle de lavande, huile essentielle de géranium, eau purifiée.

Pour 100g de crème.

FORME PHARMACEUTIQUE

Crème, tubes de 10 g et 25 g

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PROTECTEUR CUTANÉ (D. Dermatologie).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Bayer Santé Familiale
33 rue de l'Industrie - F-74240 GAILLARD
Fabricant : DELPHARM Brétigny,
F- 91731 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Traitement local d'appoint des ulcérations cutanées.

ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas :
- d'allergie à l'un des composants,
- de lésions surinfectées.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

La forme crème n'est pas adaptée à l'usage ophtalmique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter l'utilisation de la forme crème sur des lésions qui ont tendance à macérer.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE – ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Propylèneglycol.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Application selon les besoins, en général 1 à 2 fois par jour. VOIE CUTANEE.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants, notamment risque d'allergie.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
A conserver à une température inférieure à 25°C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE :

Février 1997
DE Alg 058/ 07 A 002 /97

Madécassol®

CREAM 1%
Hydrocotyle

7914**2120**/0208EXER
NOMID

COMPOSITION

HYDROCOTYLE* (*Centella asiatica; reconstituted titrated dry extract containing asiaticoside 40% and madecassic and asiatic acids 60%) **1 g**
Other ingredients: Ethylene glycol (mono + diester) palmito-stearate, propylene glycol, liquid paraffin, essential oil of lavender, essential oil of geranium, purified water.

For 100 g of cream.

PHARMACEUTICAL FORM

Cream, tubes of 10 g and 25 g.

PHARMACOTHERAPEUTIC CLASS

Skin protectant (D. Dermatology).

MANUFACTURER

DELPHARM Bretigny,
F- 91731 BRETIGNY-SUR-ORGE CEDEX FRANCE

WHAT MADECASSOL® IS AND WHAT IT IS USED FOR

This product is an adjunctive topical treatment for ulcerated skin.

BEFORE YOU USE MADECASSOL®

Do not use Madécassol® if
- you are allergic to any of the ingredients,
- you have any superinfected skin wounds.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR ARE UNSURE ABOUT ANYTHING REGARDING YOUR MEDICINE PLEASE ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

Take special care with Madécassol® cream
The cream form is not suitable for ophthalmic use.

Do not use Madécassol® cream
On lesions vulnerable to maceration.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR ARE UNSURE ABOUT ANYTHING REGARDING YOUR MEDICINE PLEASE ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

USING OTHER MEDICINES

TO AVOID INTERACTIONS BETWEEN DIFFERENT MEDICINES, INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST IF YOU ARE TAKING OR HAVE RECENTLY TAKEN ANY OTHER MEDICINES, EVEN THOSE NOT PRESCRIBED BY A DOCTOR.

PREGNANCY AND BREAST-FEEDING

AS A GENERAL RULE, BEFORE USING A MEDICATION, YOU SHOULD ALWAYS TELL YOUR DOCTOR IF YOU ARE PREGNANT OR BREAST-FEEDING.

LIST OF INGREDIENTS WITH NOTABLE EFFECTS

Propylene glycol.

HOW TO USE MADECASSOL

Apply as needed, generally once or twice daily.
CUTANEOUS ROUTE.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

As with any active substance, adverse reactions causing different degrees of discomfort may occur in some people, in particular risk of allergy.
DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE. IF YOU NOTICE ANY SIDE EFFECTS NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET, TELL YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

STORING MADECASSOL®

Do not use after the expiry date shown on the carton.
Do not store above 25°C.

DATE OF LAST REVISION:

February 1997

BAYER