Cutacnyl

péroxyde de benzoyle

GEL

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION

CUTACNYL 2,5 pour cent, gel
Numéro de la D.E :
Algérie : 14/00/07B 113/123
Maroc : 58 DMP/21/NCI

CUTACNYL 5 pour cent, gel
Numéro de la D.E :
Algérie : 14/98/07B 013/123
Maroc : 59 DMP/21/NCI

CUTACNYL 10 pour cent, gel
Numéro de la D.E :
Algérie : 14/98/07B 014/123
Maroc : 60 DMP/21/NCI

Pays d'origine : FRANCE
Liste II.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Peroxyde de benzoyle hydraté
Gel à 2,5 %
Peroxyde de benzoyle ..... 2,5 g pour 100 g
Gel à 5 %
Peroxyde de benzoyle ..... 5 g pour 100 g
Gel à 10 %
Peroxyde de benzoyle ..... 10 g pour 100 g
Excipients : Carbomère 940, Edétate disodique, Docusate de sodium, Silice colloïdale anhydre, Propylène glycol, Poloxamère 182, Solution d'hydroxyde de sodium à 10 pour cent, Glycérol, Copolymère méthacrylique;
Eau purifiée, qsp 100g

FORME PHARMACEUTIQUE :

Gel pour application cutanée.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTI-ACNEIQUES TOPIQUES
(D. Dermatologie)

NOM ET ADRESSE DU DETENTEUR DE D.E :

Galderma International
Tour Europlaza – La Défense 4
20, avenue André Prothin
92927 LA DEFENSE Cedex - France

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :

Laboratoires GALDERMA
ZI - Montdésir
74540 ALBY SUR CHERAN Cedex - France

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament est préconisé pour le traitement local de l'acné. Toutes les formes d'acné vulgaire. Cutacnyl 2.5% et Cutacnyl 5% seront préférentiellement utilisés dans les cas suivants :
- Acnés débutantes de l'adolescent,
- Chez les sujets à peau fragile, notamment les enfants, les sujets blonds ou roux,
- En début de traitement, en période d'essai, afin de s'assurer de la bonne tolérance au produit,
- En cure d'entretient des acnés blanchies.

3. ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS) :

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les malades sensibles aux peroxydes (eau oxygénée, ...).
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES :

Les patients à la peau sensible ou sensibilisée par d'autres traitements préalables (acide rétinoïque, etc. ...) doivent être avertis de certains effets secondaires pouvant apparaître au cours du traitement. Eviter d'appliquer CUTACNYL sur une plaie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas avaler.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Une prudence particulière s'impose chez les sujets à teint blond ou roux, à peau fragile et pour les lésions siégeant dans les zones plus sensibles (pourtour des yeux, cou, creux sous-claviculaire).
- Lors des premières applications, il convient, pour tester la sensibilité individuelle, d'effectuer un essai répété sur une surface cutanée réduite (touche d'essai).
- Des précautions particulièrement grandes s'imposent pour les applications sur le visage ; éviter le contact avec les yeux et les paupières, la bouche, les narines et les muqueuses. Si tel était le cas, il est recommandé d'effectuer un lavage soigneux à l'eau.
- Une prudence particulière s'impose lors d'un traitement simultané avec d'autres préparations surtout avec celles qui entraînent une desquamation de la peau (peau qui pèle). Si, avant le traitement par le peroxyde de benzoyle, le patient a déjà été traité avec des préparations exfoliantes, il est recommandé d'attendre la guérison des lésions cutanées.
- Les radiations solaires et de lampes à ultra-violets provoquent une irritation supplémentaire, il y a donc lieu d'éviter au maximum une exposition. Les patients porteurs d'un érythème solaire doivent attendre la disparition des signes avant d'entreprendre un traitement par cette préparation.
- Lorsque les phénomènes de sensation de cuisson et de rougeur deviennent intolérables, l'arrêt du traitement est conseillé.
- Pour la toilette quotidienne, il est préférable d'utiliser des produits nettoyants non irritants du type lotion nettoyante aqueuse (sans lipide) et des pains sans savons.
- Le peroxyde de benzoyle, principe actif du CUTACNYL, peut blanchir certains tissus à fibres colorées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, signalez systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE – ALLAITEMENT :

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS AYANT UN EFFET NOTOIRE :

Edétate disodique – Propylène glycol.

4. COMMENT UTILISER CE PRODUIT

POSOLOGIE :

Respecter la prescription de votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Usage local.
Se laver les mains après l'application.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Certaines réactions locales du type rougeur, desquamation de la peau (peau qui pèle), sécheresse, sensation de brûlure, peuvent apparaître au cours du traitement. Dans ce cas, la posologie doit être réduite selon avis médical.
NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :