CLOMYCINE® 3 %

Chlorotétracycline chlorhydrate

Pommade dermique

FORME ET PRESENTATION :

Pommade dermique à 3 % en chlortétracycline chlorhydrate.

Tube de 15 g.

COMPOSITION :

Chlortétracycline (DCI) chlorhydrate.....0,45g

Excipients (qsp).....15 g

Excipients : Vaseline blanche, huile de vaseline.

INDICATIONS :

- Traitement d'appoint des infections cutanées staphylococciques et/ou streptococciques (furoncle, furonculose, anthrax, impétigo, sycosis, ecthyma...) et des dermatoses impétiginisées.
- Eradication des staphylocoques sensibles dans les gîtes microbiens.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

2 ou 3 applications par jour.

La durée du traitement n'excédera pas 8 jours en raison du risque de sélection de germes résistants.

CONTRE - INDICATIONS

- Hypersensibilité à l'un des constituants.
- Infections mammaires, lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

- En cas d'infection streptococcique, une antibiothérapie par voie générale devra être envisagée.
- La sensibilisation par voie cutanée peut compromettre l'utilisation ultérieure par voie générale d'un antibiotique de la même famille.

Précautions d'emploi :

- En raison du risque de photosensibilisation, éviter l'exposition aux rayonnements UV solaires ou artificiels.
- Risque de sélection de germes résistants en cas de traitement prolongé.
- Cette forme pommade n'est pas adaptée au traitement des lésions suintantes, macérées, des plis ni des ulcères de jambe.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Ne pas utiliser en cas d'infection mammaires lors de l'allaitement, en raison du risque de digestion du produit par le nouveau-né.

EFFETS INDESIRABLES

- Possibilité d'eczéma allergique de contact. Les lésions d'eczéma peuvent disséminer à distance des zones traitées.
- Risque de photosensibilisation.

CONSERVATION :

A garder à une température ne dépassant pas les 30°C.

Liste I

TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

RESPECTEZ LES DOSES PRESCRITES

Détenteur de DE :
Groupe Industriel SAIDAL EPE/SPA.
Nom et adresse du fabricant :
Site de production Médéa, Route d'El khemis
BP 33, Médéa 26000, Algérie.

Notice révisée en Mars 2010