



Econazyl[®] 1%

Nitrate d'Éconazole

COMPOSITION:

100g de crème contiennent 1g de nitrate d'éconazole.

ACTION:

Econazyl est un antimycosique à large spectre d'action, destiné à l'emploi local. Le nitrate d'éconazole inhibe la synthèse de la membrane cellulaire et la synthèse des agents ARN et, dans une phase finale, il conduit à leur désintégration. Econazyl exerce une action sur les dermatophytes, les levures et les moisissures, ainsi que sur les coques à Gram positif.

INDICATION:

Econazyl est employé dans les traitements des maladies provoquées par:

- Saprophytes - pityriasis versicolor (dûe à Malassezia furfur), erythrasma (infection bactérienne due à Corynebacterium minutissimum).
- Dermatophytes - trichophytes (dûes à Trichophyton mentagrophytes, Tr. Rybrum, Tr. Violaceum, Tr. Verracosum, Tr. Ferrugineum, Tr. Tonsuras et d'autres..), Favus (dûs à Achorion shoenleini), microspories (dûes à Microsporum audouinii, M.canis, M.gypseum) et dermatomycose (tinea) provoquée par différentes espèces de trichophyton, qui se distinguent selon la localisation: tinéa pedis, tinéa cruris, ... etc.
- Levures du groupe candida
- Infections et surinfections provoquées par les micro-organismes à Gram positif.

CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité au nitrate d'éconazole.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Le médicament ne doit pas pénétrer dans les yeux.

EFFETS SECONDAIRES:

L'irritation locale est rare. Dans les cas de processus eczémateux, il est recommandé de traiter d'abord l'eczéma.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE:

Faire pénétrer la crème Econazyl doucement dans la peau atteinte, cela deux fois par jour. Dans les cas de mycoses affectant les mains, l'emploi du médicament après chaque lavage des mains est recommandé.

Bien sécher les zones inter-trigéneuses et y appliquer le produit. Le traitement dure jusqu'à la guérison des lésions cutanées habituellement de 3 à 6 semaines.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent ce médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LASSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRESENTATION:

Tubes de 30g de crème à 1%.

Médicament autorisé sous n°:

05/07D025/088

Fabriqué par:

Laboratoires Pharmaghreb

14125 Mellakou Tiaret.

Tél.: 046420240.

Fax: 046420205.

