

أسبيك 100

حمض اسيتيل ساليسيليك

1. الشكل و التقديم :

أبيض 28 98

2. التركيب :

- يحتوي كل قرص

- حمض اسيتيل ساليسيليك 100.....

- سيليلوز ميكروكريستالين زيت الخروع هيدروجيني سليس

لوريل سلفات

صوديوم ستيريك كروسكارميلوز صودي.

سواغ ذات فعالية ضارة : زيت الخروع هيدروجيني.

3. التصنيف الصيدلي العلاجي:

مضاد لتسرب الصفائح الدموية (بجرعات ضعيفة).

4. يوصف اسبيك 100 :

- من خطر انسداد النسيج العضلي للقلب عند المرضى الذي يعانون من الذبحة الصدرية

(الغير الذين تعرضوا سابقا لانسداد النسيج العضلي

- عند المرضى الذين تعرضوا سابقا لحادثة إقفار

- بعد عملية جراحية

- في انسداد الأوعية الدموية للأعضاء السفلية.

5. يأخذ اسبيك التالية:

- حساسية معروفة لساليسيلي.

- معدية العفج.

- جميع نزيفية (نزيف غير عادي أثناء الدورة الشهرية ونزيف عدا الدورة الشهرية

هيموفيليا نقص في الصفائح الدموية)

- مرض خطير في الكبد

-

الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي

6. تحذيرات خاصة و احتياطات الإستعمال :

- يمكن لاسبيك 100مع أن يزيد في خطر النزيف إذا كان يأخذ

للالتهابات أو الكحول.

- العلاج المتزامن مع مهيح معدي آخر

يمكن أن يزيد من خطر تهيج المعدة.

- يجب أن يستعمل اسبيك 100

لمضادات الالتهابات

- يجب التوقف من أخذ اسبيك 100مع أسبوعا قبل الخضوع إلى عملية جراحية(لأنه قد يزيد في وقت

النزيف).

- يجب أن يأخذ اسبيك 100

وظيفة كلوية متدهورة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7. التداخلات الدوائية:

يمكن لاسبيك 100

يزيد

سكرية فموية حمض فالبرويك و سلفوناميد.

اسبيك 100مع ينقص من فعالية مضادات النقرس مثل بروبنيسيد و سولفن بيرازون.

يمكن لباربيتورات والمسكنات الأخرى إخفاء الأعراض التنفسية للجرعات الزائدة للاسبيرين وزيادة

في سمها.

لتفادي التفاعلات الممكنة بين عدة أدوية، ينبغي إعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي دواء آخر

قيد الاستعمال.

8. :

ساليسيلي غير مستحب

لكم الطبيب بذلك.

استعمال ساليسيلي غير مستحب أثناء الرضاعة .

بصفة عامة، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء خلال فترة الحمل أو

9. المقادير:

الإعتيادية هي 100 300 مغ/اليوم

يأخذ الدواء مع

10. الجرعة الزائدة أو نسيان تناول جرعة أو أكثر:

في حالة نسيان أخذ الدواء،

إذا وقت الجرعة الثانية وصلت

الجرعة المنسية.

لبعض الأدوية اتصلوا حالا بطبيبكم.

11. التأثيرات الجانبية :

جانبية

- و عسر الهضم.

- الغثيان أو القيء.

- الآثار الجانبية الأقل شيوعا قد تتطلب مساعدة طبية:

- نزيف غير عادي.

-إسهال حاد.

- الأذنين،

- ارتباك،تغيير في الرؤية وفي السلوك.

- أو زيادة العطش.

تفاعلات فرط الحساسية ممكن تظهر خاصة عند مرضى الربو(طفح الجلدي

الأحقان، الوجه).

أخذ اسبيك واتصلوا بطبيبكم إذا لاحظتم هذه الأعراض.

12. الاحتياطات خاصة بالحفظ:

يحفظ 25 مئوية.

لا يترك في متناول

عدم تجاوز مدة الصلاحية

دواء مرخص به تحت الرقم: 09/12A131/447

BEKER
LABORATOIRES

مخابر بيك

ية للدار البيضاء 16100

ASPEC 100 mg

Acide acétylsalicylique

Comprimé sécable

1-PRESENTATION

Boite de 28 et 98 comprimés sécables.

2-COMPOSITION

Chaque comprimé sécable contient:

Acide acétylsalicylique.....100 mg

Excipients :

Cellulose microcristalline, huile de ricin hydrogénée, silice colloïdale anhydre, laurylsulfate de sodium, acide stéarique, croscarmellose sodique.

Excipient à effet notoire : huile de ricin hydrogénée

3-CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Médicament actif sur le sang et le système hématopoïétique ; antiagrégant plaquettaire (à faible dose).

4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES

ASPEC® 100 mg est indiqué:

- pour la réduction du risque d'infarctus du myocarde chez les patients atteints d'une angine de poitrine (angor) instable.
- chez les patients ayant déjà eu un infarctus du myocarde.
- pour la réduction du risque récurrent d'accident ischémique transitoire.
- chez un patient ayant déjà eu un accident ischémique cérébral en raison d'une embolie plaquettaire.
- après une chirurgie de contournement aortocoronarien.
- en artériopathie oblitérante des membres inférieurs.

5-CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais ASPEC® dans les cas suivants :

- allergie connue aux salicylés
- ulcère gastroduodénal
- toute maladie hémorragique (ménorragie, métorragie, hémophilie, thrombocytophénie) ;
- maladie grave du foie ou des reins
- grossesse et allaitement sauf sous surveillance médicale.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

6-PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

- L'ASPEC 100 peut augmenter le risque de saignement quand il est pris simultanément avec des corticoïdes ou l'alcool.
- La thérapie concomitante avec un autre irritant gastrique ; comme les AINS peut augmenter le risque d'irritation gastrique.
- ASPEC 100 doit être utilisé avec prudence chez les personnes ayant une hypersensibilité connue à d'autres anti-inflammatoires.
- ASPEC 100 doit être arrêté une semaine avant une intervention chirurgicale (car il peut augmenter le temps de saignement).
- ASPEC 100 doit être pris avec précaution chez les patients:
 - A fonction rénale détériorée
 - Maladie du foie sévère
 - Maladie gastro- intestinale
 - Ulcère, ulcération colitique
 - Maladie du crohn
 - Dyspepsie
 - Anémie
 - Patients déshydratés.

L'utilisation prolongée de forte dose d'ASPEC 100 peut provoquer une anémie, hémorragie gastro- intestinale et ulcération peptique

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7-INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

ASPEC 100mg peut augmenter l'activité des anticoagulant coumarinique, methotrexate, antidiabétique oraux, acide valproïque et sulphonamide.

ASPEC 100mg diminue l'effet des antigoutteux comme probenecide et sulphinyrasone.

Les barbituriques et d'autres sédatifs peuvent masquer les symptômes respiratoires des surdosages à l'aspirine et augmentent sa toxicité.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

8-GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse :

Les salicylés sont déconseillés au cours de la grossesse (particulièrement au premier et au dernier trimestre de la grossesse).

Sauf si votre médecin le juge nécessaire.

Allaitement :

Les salicylés sont déconseillés au cours de l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DEPRENDRE UN MEDICAMENT.

9-POSOLOGIE

La dose usuelle est de 100 à 300 mg/jour, de préférence à la même heure.

A avaler avec un verre d'eau.

10- SURDOSAGE OU OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez le comprimé oublié dès que possible. ne prenez jamais de dose double.

Et si le moment de la 2^{ème} prise est arrivé, sautez la dose oubliée.

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle de plusieurs doses, contactez immédiatement votre médecin.

Les symptômes de surdosage se développent rapidement chez les enfants.

11- EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Des effets secondaires possibles peuvent survenir pendant le traitement, le temps que votre organisme s'adapte au médicament:

-douleurs, brûlures ou inconfort d'estomac et indigestion.

-nausées ou vomissement.

Des effets secondaires moins communs peuvent nécessiter une assistance médicale:

-saignement inhabituel.

-diarrhée sévère.

-Bourdonnement d'oreille, céphalées sévères, vertige ou somnolence.

-confusion, changement de la vision et du comportement.

-Transpiration excessive ou soif accrue.

Des réactions d'hypersensibilité peuvent apparaître ,en particulier chez les personnes asthmatiques(éruption cutanée ou démangeaisons, difficulté de respiration, gonflement des paupières ,de la face ou des lèvres).

Arrêtez de prendre ASPEC et contactez votre médecin si vous remarquez ces symptômes. SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

12- CONDITIONS DE CONSERVATIONS

Conservé dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 25°C°.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Médicament autorisé n° : 09/12 A131 /447

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :



Laboratoires BEKER, Algérie

ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger