

**KEFORAL®**

Céfaléxine comprimé pelliculé 500 mg

**FORME ET PRESENTATION :**

Boîte de 12 comprimés pelliculés.

**COMPOSITION :**

Chaque comprimé contient :

Céfaléxine monohydratée correspondant à 500 mg de céfaléxine.

Excipients : carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium, polyvidone, hypromellose, glycérol, talc, dioxyde de titane (E 171), méthylcellulose, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172).

Excipient à effet notoire : glycérol.

**CLASSE THERAPEUTIQUE :**

Ce médicament est un antibiotique antibactérien de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines.

**INDICATIONS :**

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles.

**POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :****Posologie :**

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

A titre indicatif, la posologie usuelle est :

**Adultes :**

2 g par jour en au moins deux prises.

**Enfants de plus de 6 ans :**

25 à 50 mg/kg par 24 heures en au moins deux prises, sans dépasser la posologie adulte.

A prendre de préférence en dehors des repas notamment chez l'enfant (diminution de l'efficacité du médicament lors de sa prise avec du lait)

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Cas particulier : la durée du traitement de certaines angines est de 10 jours

**Mode et voie d'administration :**

Voie orale.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.

**CONTRE-INDICATIONS :**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'allergie aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.***MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :****Mises en garde**

La prise de comprimé ou de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer. Toute manifestation allergique (éruptions cutanées, démangeaisons...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.

Avant de prendre ce traitement, prévenir votre médecin si à l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur vous avez présenté un urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, oedème de Quincke (variété d'urticaire avec brusque enfllement du visage et du cou).

La survenue de diarrhée au cours d'un traitement antibiotique ne doit pas être traitée sans avis médical.

**Précautions d'emploi :**

Prévenez votre médecin en cas :

- d'insuffisance rénale,
- d'antécédents allergiques, notamment aux antibiotiques,
- de diarrhée.

Ce médicament peut fausser le résultat de certains examens de laboratoire (test de Coombs, glycosurie, recherche de la créatinine).

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.***INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :***AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.***GROSSESSE ET ALLAITEMENT :****Grossesse :**

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse.

**Allaitement :**

L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament.

Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption cutanée, candidose (affection due à certains champignons microscopiques), avertissez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite à tenir car ces effets sur votre enfant sont peut-être dus à ce médicament.

*D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.***EFFETS INDESIRABLES :**

- Manifestations allergiques: éruptions cutanées, fièvre, choc allergique, oedème de Quincke (brusque enfllement du visage et du cou d'origine allergique), démangeaisons ano-génitales avec ou sans champignons (candidose), éruptions cutanées sévères très exceptionnelles, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (syndrome de Stevens-Johnson/ syndrome de Lyell),
- Manifestations hématologiques : modification du nombre de certains globules blancs ou des plaquettes, réversible à l'arrêt du traitement, diminution du nombre de globules rouges;
- Troubles digestifs: diarrhée, nausée, vomissement. De rares cas de colites pseudo-membraneuses (maladie de l'intestin avec diarrhées et douleurs abdominales) ont été rapportés;
- Manifestations hépatiques: élévation transitoire de certaines enzymes du foie (ASAT - ALAT), atteinte du foie, jaunisse;
- Manifestations rénales: quelques rares cas d'atteinte rénale réversible à l'arrêt du traitement.

*SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE***SURDOSAGE :**

En cas de prise excessive de ce médicament, prévenir immédiatement un médecin; un traitement et une surveillance peuvent vous être proposés.

**MODE DE CONSERVATION :**

Conserver à une température inférieure à 30°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.

NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS.

Liste I

Médicament autorisé n°:  
16/97/13 B 010/263Compléter la date de mis  
à jour de la notice:  
Février 2016**Titulaire :**BIO PHARM SPA : Zone industrielle Réghaia,  
Haouche Mahieddine, lot N°18, section N° 5  
Réghaia, Alger.Fabriqué par :  
FACTA FARMACEUTICI S.P.A.,  
Via Laurentina Km 24,730  
Pomezia (Roma) -Italie.