



CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique

ciprofloxacine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique

La substance active est:

Ciprofloxacine	0,30 g
sous forme de chlorhydrate de ciprofloxacine.....	0,35 g
pour 100 g	

Les autres composants sont:

la paraffine liquide et la vaseline.

Détenteur de la décision d'enregistrement:

LABORATOIRES ALCON
4, rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL-MALMAISON Cedex

Fabricant:

S.A. ALCON-COUVREUR N.V.
Rijksweg, 14
B-2870 PUURS

1. QU'EST-CE QUE CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

Pommade ophtalmique, tube de 3,5 g.

Classe pharmaco-thérapeutique: autres anti-infectieux.

Ce médicament est une pommade ophtalmique contenant un antibiotique de la famille des quinolones, du groupe des fluoroquinolones: la ciprofloxacine.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de l'âge de 1 an, dans le traitement local de certaines infections sévères de l'œil dues à des bactéries pouvant être combattues par cet antibiotique: conjonctivites sévères, kératites (inflammation de la cornée d'origine bactérienne), ulcères de la cornée et abcès de la cornée.

2. DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique? Ne pas utiliser CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique:

- si vous êtes allergique à la ciprofloxacine ou à un autre médicament de la famille des quinolones,
- si vous êtes allergique à l'un des composants de cette pommade,
- si vous allaitez (voir rubrique Grossesse et allaitement).

Si vous devez traiter les deux yeux, recommencez ces étapes pour l'autre œil.

Se conformer à la prescription de votre médecin.

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

La disparition des symptômes ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement, mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Si vous avez utilisé plus de CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique que vous n'auriez dû, rincez votre œil avec de l'eau tiède.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique:

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

5. Prise ou utilisation d'autres médicaments:

L'efficacité d'une pommade ophtalmique peut être perturbée par l'instillation concomitante d'un collyre. En cas de traitement concomitant par un collyre contenant une substance active différente, appliquer la pommade à 15 minutes d'intervalle. Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

6. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Fréquents

Effets oculaires: dépôts de couleur blanche qui disparaissent malgré la poursuite du traitement, gêne oculaire (démangeaisons et sensations de brûlures passagères après l'application).

Peu fréquents

Effets oculaires: vision floue, yeux rouges, démangeaisons, baisse de la vue, douleur, larmolements, sensibilité excessive à la lumière.

Effets sensoriels: modification du goût (goût métallique)

Effets cutanés: inflammation de la peau.

Très rarement

Avec les fluoroquinolones administrées localement, éruption cutanée étendue, épidermolyse toxique et syndrome de Stevens-Johnson (décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps), dermatite exfoliative (inflammation de la peau avec bulles), urticaire.

Chez l'enfant

- à un autre médicament de la famille des quinolones,
- si vous êtes allergique à l'un des composants de cette pommade,
- si vous allaitez (voir rubrique Grossesse et allaitement).

Prendre des précautions particulières avec CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique:

Le traitement doit être interrompu au premier signe d'éruption cutanée ou de toute autre symptôme évocateur d'une allergie (par exemple gonflement des paupières, rougeur oculaire, gêne respiratoire.)

Des réactions allergiques à type d'urticaire, démangeaisons, fourmillements, et des chocs d'origine allergique généralisés (brusque gonflement du visage et du cou, gêne respiratoire, chute de la tension artérielle) pouvant mettre en jeu la vie, ont été observés, parfois dès la première prise, chez des patients traités par des médicaments de la famille des quinolones administrés par voie orale ou par injection.

Ne pas prolonger le traitement au-delà de la date prévue sur l'ordonnance.

En l'absence d'amélioration rapide ou en cas de symptômes anormaux, consultez votre médecin. Le port de lentilles de contact est à éviter durant le traitement.

3. GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse:

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement:

L'administration de ce médicament fait contre-indiquer l'allaitement, en raison du passage du produit dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

4. COMMENT UTILISER CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique?

Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situation précise:

- il ne peut être adapté à un autre cas;
- ne pas le réutiliser sans avis médical;
- ne pas le conseiller à une autre personne.

Posologie

Cette pommade ophtalmique est destinée à l'adulte et à l'enfant à partir de l'âge de 1 an.

A titre indicatif, la posologie usuelle est la suivante:

Abcès cornéens: appliquer un ruban de 1,25 cm dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil toutes les 1 ou 2 heures, même pendant la nuit, pendant 2 jours, puis toutes les 4 heures pendant les 12 jours suivants.

Conjonctivites, kératites, ulcères cornéens: appliquer un ruban de 1,25 cm dans le cul-de-sac conjonctival trois fois par jour pendant 2 jours, puis 2 fois par jour pendant les 5 jours suivants.

Les schémas posologiques peuvent être adaptés selon l'appréciation du médecin.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de CILOXAN® 0,3%, pommade ophtalmique est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie ophtalmique

- Lavez-vous soigneusement les mains.
- Prenez le tube de cette pommade ophtalmique et placez-vous devant un miroir.
- Penchez la tête en arrière. Avec un doigt propre, tirez doucement votre paupière vers le bas pour créer un sillon entre la paupière et l'œil. Le ruban de pommade sera déposé à cet endroit.
- Rapprochez l'embout du tube de votre œil.
- Ne touchez pas votre œil, les paupières ou d'autres surfaces avec l'embout du tube.
- Appuyez légèrement sur le tube pour libérer le ruban de pommade.
- Fermez votre œil pendant quelques secondes après avoir appliqué la pommade dans votre œil.

épidermolyse toxique et syndrome de Stevens-Johnson (détachement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps), dermatite exfoliative (inflammation de la peau avec bulles), urticaire.

Chez l'enfant

Dans les études cliniques, aucune réaction indésirable grave n'a été observée chez les enfants âgés de 1 à 12 ans.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

7. Conduite de véhicules et utilisation de machines:

En raison du risque de vision floue, vous devez être attentif à votre propre réaction au traitement avant de vous livrer à des occupations nécessitant une certaine vigilance, telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine. Attendre avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine, que la vision redevienne normale.

8. COMMENT CONSERVER CILOXAN® 0,3% pommade ophtalmique?

A conserver à une température ne dépassant pas + 25°C.

Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler. A la fin du traitement, le reste du tube doit être jeté et ne doit pas être conservé en vue d'une réutilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Après 1ère ouverture: 1 mois

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 24 février 2012.

La date de révision en Algérie: Juin 2011

CONSEILS/EDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Ceci, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance: il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas:

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence pour préserver l'efficacité de ce médicament:

- 1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2) Respectez strictement votre ordonnance.
- 3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

N° d'enregistrement: 08/17D151/028

Liste I

Alcon®