

Tanganil 500 mg

Acétyl-leucine

1 - IDENTIFICATION DU MEDICAMENT. Composition qualitative et quantitative :

Acétyl-dl-leucine 500 mg. Excipients : amidon de blé, amidon de maïs pré-gélatinisé, carbonate de calcium, stéarate de magnésium q.s.p. 1 comprimé.

Forme pharmaceutique : Comprimé. - Etui de 30 comprimés sous plaquettes thermoformées (PVC/ALU) - Etui de 30 comprimés en pilulier.

Classe pharmaco-thérapeutique : ANTIVERTIGINEUX DE MECANISME D'ACTION INCONNU (Système nerveux central).

Nom et adresse de l'exploitant : Laboratoires Pierre Fabre.

PIERRE FABRE MEDICAMENT. 45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne - France.

Nom et adresse du fabricant : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION.

Etablissement Progipharm. Rue du Lycée, 45502 Gien cedex - France.

2 - DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques) :

Ce médicament est préconisé dans le traitement des vertiges.

3 - ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

(Contre-indications) : Les comprimés ne doivent pas être utilisés en cas d'intolérance au gluten (présence d'amidon de blé). EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement : En cas de grossesse, prévenir votre médecin.

Interactions médicamenteuses et autres interactions : AFIN D'EVITER D'EVEN- TUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

4 - COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT. Posologie et mode d'emploi :

Chez l'adulte : En moyenne 3 à 4 comprimés en 2 prises matin et soir. La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique ; au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée. DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

5 - EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (Effets indésirables) : COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS. NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

6 - CONSERVATION : Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

Précautions particulières de conservation : Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

Médicament autorisé en France n° 338 457-3 (étui de 30 comprimés sous plaquettes thermoformées) ; n° 316 088-5 (étui de 30 comprimés en pilulier).

Tanganil 500 mg

Acetyl-leucine

1 - MEDICINE IDENTIFICATION. Qualitative and quantitative composition:

Acetyl-dl-leucine 500 mg. Excipients: wheat starch, pregelatinised maize starch, calcium carbonate, magnesium stearate, q.s. one tablet.

Pharmaceutical form: Tablet - Box of 30 tablets in thermoformed (PVC/Al) blisters - Box of 30 tablets in a pill bottle.

Pharmaco-therapeutic class: ANTIVERTIGO AGENT WITH UNKNOWN ACTION MECHANISM (Central nervous system).

Name and address of distributor: Laboratoires Pierre Fabre.

PIERRE FABRE MEDICAMENT. 45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne - France

Name and address of manufacturer: PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION.

Etablissement Progipharm. Rue du Lycée, 45502 Gien Cedex - France.

2 - WHEN THIS MEDICINE SHOULD BE USED (Therapeutic indications):

This medication is recommended for treatment of vertigo.

3 - ATTENTION! WHEN THIS MEDICINE SHOULD NOT BE USED

(Contraindications): Tablets should not be used in the case of gluten intolerance (presence of wheat starch). WHEN IN DOUBT, ALWAYS ASK FOR YOUR DOCTOR'S OR PHARMACIST'S ADVICE.

Pregnancy - Breast-feeding: Notify your doctor if you are pregnant.

Interactions with other medications, other interactions:

IN ORDER TO PREVENT POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL MEDICINES, YOU MUST SYSTEMATICALLY INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST IF YOU ARE TAKING ANY OTHER MEDICINE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

4 - HOW TO USE THIS MEDICINE. Dosage and method of administration:

In adults: An average of 3 to 4 tablets in two doses (morning and evening).

The duration of treatment is variable according to the clinical progress. At the beginning of treatment or if there is no improvement, the dosage may be increased. ALWAYS FOLLOW STRICTLY YOUR DOCTOR'S PRESCRIPTION.

5 - UNDESIRABLE EFFECTS CAUSING DISCOMFORT (Adverse effects):

LIKE ANY ACTIVE SUBSTANCE, THIS MEDICINE MAY CAUSE MORE OR LESS UNPLEASANT EFFECTS IN CERTAIN PEOPLE. DO NOT HESITATE TO ASK FOR YOUR DOCTOR'S OR PHARMACIST'S ADVICE.

6 - STORAGE: Do not exceed the expiry date indicated on the external packaging.

Special precautions for storage: This medicine must be stored at a temperature below 25°C and protected from humidity.

Medicine authorized in France No. 338 457-3

(box of 30 tablets in thermoformed blisters) ;

No. 316 088-5 (box of 30 tablets in a pill bottle).