

## MEVERC®

Béthahistine dichlorhydrate 8mg  
Comprimé nu

### FORME ET PRESENTATION :

Comprimé nu à 8 mg de béthahistine dichlorhydrate : Boite de 20 comprimés.

### COMPOSITION:

Béthahistine dichlorhydrate (D.C.I) :  
8 mg .  
Lactose monohydraté

### CLASSE THERAPEUTIQUE :

Antivertigineux (N : système nerveux central).

### INDICATIONS

#### THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est préconisé :  
- Traitement symptomatique du vertige itératif avec ou sans signe cochléaire

### POSOLOGIE ET MODE

#### D'ADMINISTRATION :

##### voie orale :

se conformer à la prescription médicale.

La posologie usuelle : 1 à 2 comprimés 3 fois par jour, de préférence au milieu des repas, sans dépasser 6 comprimés, Soit 48mg de béthahistine par jours.

Enfants et adolescents de moins de 18 ans n'est pas recommandée.

Sujets âgés : la béthahistine doit être utilisée avec prudence chez le sujet âgé.  
Durée du traitement : la durée du traitement recommandée est de 2 à 3 mois à renouveler éventuellement, suivant l'évolution de la maladie, en cures continues ou discontinues.  
Les comprimés doivent être avalés sans être croqués avec un peu d'eau au cours des repas.

### CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des composants de ce médicament
- Ulcère gastroduodénal en poussée.
- Phéochromocytome

### MISES EN GARDE ET

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- la prise du médicament au milieu des repas permet d'éviter les gastralgies.
- Chez les asthmatiques, l'administration de béthahistine nécessite une surveillance particulière (risque de bronchoconstriction)
- La béthahistine ne constitue pas le traitement adapté des pathologies suivantes :
  - vertige paroxystique bénin
  - vertige en relation avec une affection du système nerveux central
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption du glucose et galactose, ou de déficit en lactase.

### INTERACTIONS

#### MEDICAMENTEUSES :

Il pourrait se produire une interaction entre la béthahistine et l'un des médicaments :  
- Les antihistaminiques.  
- Les bêta-2-agonistes.

### GROSSESSE ET

#### ALLAITEMENT :

##### Grossesse :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser la béthahistine pendant la grossesse.

##### Allaitement :

L'allaitement est déconseillé pendant la prise de béthahistine.

### CONDUITE DES VEHICULES

#### ET UTILISATION

##### DES MACHINES :

La béthahistine peut entraîner une somnolence.

Si vous souffrez de cet effet indésirable, vous devez éviter les activités qui demandent d'être attentif, comme la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

### EFFETS INDESIRABLES :

- effets indésirables les plus fréquents : gastralgies, nausées, vomissements, sécheresse buccale, diarrhée
- plus rarement : céphalées, asthénie,

somnolence, réaction d'hypersensibilité.

- Exceptionnellement : thrombopénie, élévation des transaminases

### SURDOSAGE :

Symptôme analogues à ceux provoqués par l'histamine  
Administer un traitement antihistaminique

### CONDITIONS DE

#### CONSERVATION :

A conserver à l'abri de la lumière et à une température qui ne dépasse pas 25° C  
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

### CONDITIONS DE DELIVRANCE :

Liste I : uniquement sur ordonnance

### MEDICAMENT ENREGISTRE N° :

07/18C007/077

*Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants*

*Vous pouvez encore avoir besoin de cette notice, ne la jetez pas avant d'avoir terminé votre traitement.*

Fabriqué par:

**ILAM**

Laboratoire Algérien du Médicament

26, Zone d'activité Zéralda

Tél : 213.23.20.81.42/49 . Fax : 213.23.20.81.29

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Mai 2014