

Fluvermal®

FLUBENDAZOLE

100mg Comprimé

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Identification du médicament

Composition

Pour un comprimé :
flubendazole..... 100mg,
talc, saccharose, amidon de pomme de terre, amidon prégélatinisé,
laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium, cellulose microcristalline.

Forme pharmaceutique

Boîte de 6 comprimés.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTHELMINTHIQUES

Titulaire : McNeil S.A.S.

1, rue Camille Desmoulins TSA 20005
92787 ISSY-LES-MOULINEAUX cedex 9

Exploitant : JANSSEN-CILAG

1, rue Camille Desmoulins TSA 91003
92787 ISSY-LES-MOULINEAUX cedex 9

Fabricant : Janssen-Cilag

27100 VAL DE REUIL (FRANCE)

Dans quel cas utiliser ce médicament?

FLUVERMAL est utilisé pour le traitement des infestations par certains vers parasites du tube digestif : oxyure, ascaris, trichocéphale, ankylostome.

Attention!

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

Par prudence, sauf avis contraire de votre médecin, il est préférable d'éviter la prise de flubendazole pendant la grossesse ou l'allaitement. D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients: Saccharose

Comment utiliser ce médicament?

Posologie

La posologie est identique chez l'enfant et chez l'adulte. Elle dépend du ver infestant :

- oxyure : 1 comprimé en prise unique. La prise sera renouvelée 15 à 20 jours plus tard afin d'éliminer totalement toute infestation.

Des mesures d'hygiène rigoureuses corporelles (nettoyage des ongles, etc...) et vestimentaires doivent accompagner le traitement pour éliminer le risque de réinfestation.

- ascaris, trichocéphalose, ankylostomiase : 1 comprimé matin et soir pendant 3 jours.

FLUVERMAL existe sous forme de comprimé et de suspension buvable. DANS TOUS LES CAS, CONFORMEZ-VOUS À LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés peuvent être pris avec un peu d'eau ou peuvent être croqués pendant les repas.

Ni purge, ni jeûne préalable ne sont nécessaires. Il n'y a pas lieu de prévoir un régime alimentaire particulier pendant le traitement.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris accidentellement une trop grande quantité de FLUVERMAL, consultez immédiatement votre médecin, par mesure de sécurité.

Effets non souhaités et gênants

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

FLUVERMAL est généralement bien toléré et peu d'effets indésirables sont observés aux doses prescrites.

Rarement, peuvent apparaître des douleurs abdominales, nausées ou une diarrhée, en particulier en cas d'infestation importante par les vers. Dans ce cas poursuivez normalement le traitement par FLUVERMAL.

Dans de rares cas, des réactions allergiques à type d'urticaire, éruption cutanée, rougeur, gonflement du visage et du cou (oedème de Quincke) ont été observés.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ E GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur même si le médicament a été conservé dans les conditions recommandées.

Conservez FLUVERMAL entre 15°C et 30°C.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

© McNeil 2007

JANSSEN-CILAG



JANSSEN-CILAG

Date de révision de la notice : Septembre 2006.