

OXOMEMAZINE

(Oxoméazine chlorhydrate. DCI)
Solution buvable
Flacon de 100ml

Antihistaminique à usage systémique
5mg / 5ml
Solution buvable

N° Enreg : 97 / 20 C 055 / 073



Forme et présentation : Solution buvable, Flacon de 100ml
1 cuillère à café = 5ml de solution = 5mg de principe actif

Composition :

Oxoméazine (DCI) chlorhydrate0,111 mg

Excipients :

Parahydroxybenzoate de méthyle sodé, de propyle sodé, saccharose, eau.....QS.P 100ml

Classe Pharmaco thérapeutique :

Antihistaminique à usage systémique (R : système respiratoire).

Indications :

- Traitement symptomatique des toux non productives gênantes en particulier allergiques et irritatives.
- Traitement des manifestations allergiques diverses, rhinite spasmodique (périodique ou apériodique), conjonctivite, oedème de Quincke, urticaire
- Traitement des affections dermatologiques prurigineuses (eczéma, prurigos...).

Contre indications :

Absolues :

- Hypersensibilité à l'un des constituants, notamment aux antihistaminiques.
- Antécédents d'agranulocytose.
- Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétrorprostatiques.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Relatives :

- Pendant le premier trimestre de la grossesse et en cas d'allaitement.
- Sultopride : interactions médicamenteuses.

Précautions d'emploi :

- Il est recommandé de ne pas l'utiliser chez les enfants âgés de moins de 1 an.
- La surveillance (clinique et électrique) doit être renforcée chez les épileptiques: possibilité d'abaissement du seuil épiléptogène.
- A utiliser avec prudence :

Chez tout sujet âgé sensible à l'hypotension orthostatique, aux vertiges, à la sédation, constipation chronique, hypertrophie prostatique, chez les sujets atteints d'affections cardiovasculaires.

En cas d'insuffisance hépatique et/ou rénale sévère,

- La prise de boissons alcoolisées ou médicaments contenant de l'alcool est fortement déconseillée pendant la durée du traitement.

Effets indésirables :

- Sédation ou somnolence.
- Sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de l'accommodation, mydriase, palpitations cardiaques, rétention urinaire.
- Hypotension orthostatique, vertiges, tremblements, confusion mentale, hallucination.
- Notamment chez le nourrisson : agitation, nervosité, insomnie.

Posologie et mode d'administration : Voie orale

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 1 an.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin en particulier chez le nourrisson.

La posologie est à répartir en 2 ou 3 prises.

Adulte et enfant de plus de 40kg (soit 12 ans) 2 à 8 cuillerées à café de solution buvable.

Enfants: en fonction du poids de l'enfant

1 à 2 ans et demi = 1 à 2 cuillerées à café.

2 ans et demi à 12 ans = 2 à 4 cuillerées a café.

Les prises sont à renouveler en cas de besoin et doivent être espacées de 4 h minimum

Il convient de privilégier les prises vespérales en raison d'effet sédatif, surtout en début de traitement, de l'Oxoméazine.

Surdosage:

" Convulsions (surtout chez le nourrisson et l'enfant) troubles de la conscience, coma.

-Traitement symptomatique en milieu spécialisé.

N° d'enregistrement : 97 / 20C055 / 073.

