

# Naaxia

## Collyre anti-allergique 5 ml

Acide N-acetyl aspartyl glutamique 4,9 %

### ■ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### COMPOSITION :

- Acide N-acétyl aspartyl glutamique, sel de sodium.....4,90 g
- Chlorure de benzalkonium.....0,01 g
- Acide chlorhydrique ou soude q.s.p. ....pH 7,2
- Eau distillée q.s.p. ....100 ml

#### LISTE DES EXCIPIENTS AYANT UN EFFET

##### NOTOIRE :

Chlorure de benzalkonium.

#### FORME PHARMACEUTIQUE :

Collyre, flacon de 5 ml.

#### TITULAIRE / EXPLOITANT / DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT :

Laboratoires Théa,  
12 rue Louis Blériot,  
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2,  
France

#### FABRICANT :

EXCELVISION,  
Rue de la Lombardière,  
07100 Annonay - France

### ■ INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est un collyre anti-allergique. Il est préconisé dans le traitement de certaines affections oculaires allergiques (conjonctivites, blépharoconjonctivites).

### ■ ATTENTION

#### CONTRE INDICATIONS :

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### ■ MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le port de lentilles de contact est déconseillé durant l'utilisation de NAAXIA en raison du risque d'adsorption sur la lentille.

ENFANT : absence d'étude chez l'enfant de moins de 4 ans.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants du collyre.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Si vous utilisez actuellement (ou avez prévu d'utiliser) un autre collyre, attendez 15 minutes entre les instillations.

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien, si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### GROSSESSE - ALLAITEMENT :

*D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.*

### ■ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

#### POSOLOGIE :

2 à 6 instillations par jour.

#### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

### ■ EFFETS INDESIRABLES

Des sensations brèves de brûlure ou de picotement peuvent parfois se produire lors de l'instillation.

### ■ CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

Le flacon ne doit pas être conservé au-delà de 4 semaines après ouverture. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

### ■ DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Décembre 2010

N° DE Algérie : 08/97/17B 100/022

Enregistrement TN : 8443011

Enregistrement MA : 106/12DMP/21/NCdP

Les Laboratoires THEA cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Les Laboratoires THEA participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les Laboratoires THEA vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

