

NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 21/07/2011

Dénomination du médicament

ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre
Lodoxamide

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?
3. COMMENT UTILISER ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Autres antiallergiques

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement des affections oculaires d'origine allergique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre dans le cas suivant:

Hypersensibilité au lodoxamide ou à l'un des composants du collyre.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre:

Mises en garde spéciales

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

Le chlorure de benzalkonium peut teinter les lentilles de contact souple.

Le port de lentilles de contact souples (hydrophiles) est déconseillé durant l'utilisation de ce collyre.

Précautions d'emploi

Ne pas dépasser la posologie prescrite.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 5 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments**Utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous utilisez un autre collyre, attendez au moins 5 minutes entre ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre et l'autre collyre.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**Grossesse et Allaitement**

Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Comme avec tout collyre, l'instillation de ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre, peut provoquer des troubles visuels transitoires. Ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines avant que cet effet ait disparu.

Liste des excipients à effet notable

Informations importantes concernant certains composants de ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre

Liste des excipients à effet notable: Chlorure de benzalkonium.

3. COMMENT UTILISER ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?**Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**Posologie**

Selon la sévérité des symptômes: 1 à 2 gouttes dans l'œil malade, 2 à 4 fois par jour à intervalles réguliers.

Après amélioration des symptômes, le traitement pourra être prolongé pour maintenir l'amélioration.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE

Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Instiller 1 à 2 gouttes de collyre dans le cul-de-sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement la paupière vers le bas.

L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent.

Refermer le flacon après utilisation.

Fréquence d'administration

Espacer les instillations quotidiennes.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 5 minutes entre chaque instillation.

Durée du traitement

Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Ne pas prolonger le traitement sans avis médical.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre que vous n'auriez dû:

Rincez l'œil avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autre goutte jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous ingérez accidentellement ce médicament, consultez immédiatement votre médecin. Les symptômes d'une ingestion accidentelle sont: une sensation transitoire de chaleur, une transpiration abondante, une diarrhée, des étourdissements et une sensation de distension de l'estomac.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous avez oublié de prendre ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre:

Si vous oubliez une dose, contentez-vous de prendre normalement la dose suivante.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent se manifester dans votre œil:

Très fréquents: irritation oculaire, douleur oculaire, gêne oculaire. Ces effets se produisent généralement lors de l'instillation et sont transitoires.

Fréquents: sécheresse oculaire, démangeaison oculaire, formation de croûtes au niveau des paupières, augmentation de la production de larmes, rougeur oculaire, vision floue.

Peu fréquents: œdème des paupières (gonflement des paupières), réactions allergiques locales et trouble de la vision.

Les effets indésirables suivants peuvent également se manifester dans d'autres régions du corps:

Peu fréquents: vertiges, maux de tête, somnolence, nausées, troubles gastriques, éruption, sensation de chaleur.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

Ce médicament doit être conservé verticalement à température ambiante et utilisé dans les 15 jours après l'ouverture du flacon.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre ?

La substance active est:

Lodoxamide trométhamol 0,1780 g
Quantité correspondant à lodoxamide 0,1000 g
Pour 100 ml de collyre.

Les autres composants sont:

Chlorure de benzalkonium, mannitol, édétate de sodium, méthylhydroxypropylcellulose 2910, citrate de sodium (dihydraté), acide citrique (monohydraté), tyloxapol, acide chlorhydrique (1N) et/ou hydroxyde de sodium (1N), eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que ALMIDE 0,1 POUR CENT, collyre et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre. Flacon de 5 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

LABORATOIRES ALCON
4, RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE
LES COLONNADES
92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Exploitant

LABORATOIRES ALCON
4, RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE
92563 RUEIL MALMAISON CEDEX
FRANCE

Fabricant

S.A. ALCON-COUVREUR N.V.
RIJKSWEG 14
2870 PUURS
BELGIQUE
ou
LABORATOIRES ALCON CUSI
CAMIL FABRA 58
08320 EL MASNOU
(BARCELONE)
ESPAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.