

# Chibroxine 0,3 POUR CENT, collyre en solution

Norfloxacine

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir rubrique 4.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, COLLYRE EN SOLUTION ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un collyre en solution contenant un antibiotique de la famille des quinolones, du groupe des fluoroquinolones: la norfloxacine.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections sévères de l'œil dues à des bactéries pouvant être combattues par cet antibiotique: conjonctivites sévères, kératites (inflammation de la cornée d'origine bactérienne) et ulcères de la cornée.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, COLLYRE EN SOLUTION ?

N'UTILISEZ JAMAIS CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution dans les cas suivants :

- allergie à l'un des composants de ce collyre.
- allergie aux quinolones.
- ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant l'allaitement.

Faites attention avec CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution :

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Le traitement doit être interrompu dès les premiers signes d'éruption cutanée ou de tout autre signe d'une réaction allergique.
- Ne pas toucher l'œil avec l'embout du flacon.
- En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.
- **Porteurs de lentille de contact :** Le port de lentilles de contact est déconseillé lors d'infections oculaires. Néanmoins si votre médecin vous autorise à porter des lentilles de contact durant votre traitement vous devez : Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples.

En cas d'administration simultanée de différents collyres, les administrations doivent être espacées d'au moins 15 minutes.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### Grossesse

L'utilisation de ce collyre peut être envisagée au cours de la grossesse, si besoin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Allaitement

L'administration de ce collyre est déconseillée au cours de l'allaitement en raison du passage de ce médicament dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : chlorure de benzalkonium.

## 3. COMMENT UTILISER CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, COLLYRE EN SOLUTION ?

### Posologie/Fréquence d'administration

A titre indicatif, la posologie usuelle est de 1 ou 2 gouttes 4 fois par jour dans l'œil (ou les yeux) atteint(s).

Si vous avez l'impression que l'effet de CHIBROXINE 0,3 pour cent, collyre en solution est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### Mode d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Se laver soigneusement les mains avant de pratiquer l'instillation.

Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Instillez une goutte dans l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière vers le bas.

Fermer l'œil quelques secondes.

L'œil fermé, essuyer proprement l'excédent.

Reboucher le flacon après chaque instillation.

### Durée de traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

Si vous avez utilisé plus de CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Les plus fréquemment rencontrés: sensations de brûlure ou de picotement local.

- Plus rarement : rougeur et inflammation de l'œil, sensibilité excessive à la lumière, goût amer après l'administration.
- Très rarement : dépôts dans l'œil.
- En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, risque d'eczéma, d'irritation.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, COLLYRE EN SOLUTION ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur la boîte, le flacon.

Après ouverture, le médicament peut être conservé 15 jours maximum.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ce médicament est sensible à la lumière, conserver le flacon dans l'emballage extérieur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution ?

**La substance active est :**

Norfloxacine..... Pour 100 ml .....300 mg

**Les autres composants sont :**

Acétate de sodium trihydraté, chlorure de benzalkonium, édétate de sodium, solution d'acide chlorhydrique N, chlorure de sodium, eau pour préparations injectables.

**Qu'est-ce que CHIBROXINE 0,3 POUR CENT, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de collyre en solution. Flacon de 5 ml.

**Titulaire/Exploitant/Détenteur de la Décision d'Enregistrement**

LABORATOIRES THEA  
12, RUE LOUIS BLERIOT  
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

**Fabricant**

EXCELVISION  
RUE DE LA LOMBARDIERE  
07100 ANNONAY

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le 04/2015

Date Approbation Algérie: Juin 2015

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

#### CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

##### QUE SAVOIR SUR LES ANTI-BIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

**En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

- 1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2- Respectez strictement votre ordonnance.
- 3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

N° DE Algérie : 99/17D 029/022

AMM Maroc n° : 34 DMP/21/NCI

Liste I



**TRIEZ VOS EMBALLAGES**



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)  
VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE

23268503

N2220C5MAG/0515