

TRAMADOL LS®

Chlorhydrate de tramadol 100mg



FORME ET PRESENTATION

Gélules dosées à 100 mg. Boîte de 30 gélules.

COMPOSITION

Tramadol chlorhydrate (DCI) 100 mg
Excipients 1 q.s.p une suppositoire

QU'EST-CE QUE TRAMADOL LS 100 MG GELULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antalgique (calme la douleur). Il est indiqué dans le traitement des douleurs modérées à intenses de l'adulte.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE TRAMADOL LS 100 MG GELULE?

Ne pas prendre TRAMADOL LS 100 mg gélule dans les cas suivants :

- Allergie au tramadol ou aux morphiniques.
- Intoxication aiguë ou surdosage avec les produits agissant sur le système nerveux central (alcool, somnifères, autres médicaments contre la douleur...).
- Traitement simultané ou récent par certains antidépresseurs.
- Insuffisance respiratoire sévère, maladie sévère du foie.
- Enfant de moins de 15 ans.
- Allaitement.
- Epilepsie non contrôlée par un traitement.
- Association avec la buprénorphine, la nalbuphine, la pentazocine.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin : pendant la grossesse, en association avec la carbamazépine (médicament de l'épilepsie).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISE EN GARDE

Précautions d'emploi : Prévenez votre médecin en cas de maladie grave du foie ou des reins, car il convient de modifier la posologie.

Mise en garde : L'utilisation prolongée de ce médicament peut conduire à un état de dépendance. Respectez la prescription de votre médecin.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement : Par mesure de prudence, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allaitement.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

TRAMADOL LS 50 mg peut entraîner un risque de somnolence. Ce risque est majoré en cas de prise concomitante d'alcool ou de médicaments sédatifs.

COMMENT PRENDRE TRAMADOL LS 100 MG GELULE ?

Comme pour tous les médicaments antalgiques, la posologie du tramadol doit être adaptée à l'intensité de la douleur et à la réponse clinique de chaque patient.

Douleurs aiguës : La dose d'attaque est de 100 mg (2 gélules) suivie de 50 ou 100 mg (1 ou 2 gélules) toutes les 4-6 heures sans dépasser 400 mg/24 h (8 gélules).

Douleurs chroniques : la dose d'attaque est de 50 ou 100 mg (1 ou 2 gélules) suivie de 50 ou 100 mg (1 ou 2 gélules) toutes les 4-6 heures sans dépasser 400 mg/24 h (8 gélules).

- A partir de 75 ans, il est recommandé d'augmenter l'intervalle entre les prises (toutes les 9 heures).
- En cas d'insuffisance hépatique : réduire la dose unitaire de moitié ou augmenter de 2 fois l'intervalle entre les prises (toutes les 12 heures).
- En cas d'insuffisance rénale : augmenter de 2 fois l'intervalle entre les prises (toutes les 12 heures pour une clairance de la créatinine 30 ml/min). Eviter d'utiliser le TRAMADOL LS 50 si la clairance de la créatinine est 10 ml/min.

Mode D'administration : Voie orale. Avaler les gélules avec un verre d'eau.

Si vous oubliez de prendre TRAMADOL LS 50 mg gélule : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

- Possibilité de troubles neuro-psychiques de type confusion et exceptionnellement hallucinations et/ou délire ; convulsions principalement chez des patients prédisposés.
- Nausées, vomissements, somnolence, maux de tête, vertiges, sueurs, sécheresse buccale, et en traitement prolongé, constipation.
- Rarement, douleurs abdominales, éruption, fatigue, troubles visuels ;
- Très rarement réactions allergiques, difficulté d'uriner, troubles de la respiration, dépendance, syndrome de sevrage après une utilisation prolongée entraînant des symptômes tels que : agitation, anxiété, nervosité, insomnie, tremblements et troubles gastro-intestinaux.

COMMENT CONSERVER TRAMADOL LS 50 MG GELULE?

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte. A conserver à une température inférieure à 25 °C.

D.E.N° : 08/03F 047/231

Date de mise à jour de la notice :





ترامادول ل س[®]

ترامادول كلورهيديرات 100 مغ

شكل و تقديم
كبسولات: علبة ب 30

مع تناول الكحول أو الأدوية المهدئ

كيف يستعمل ترامادول ل س 100 مغ ؟

مقادير هذا الدواء تكون مكيفة حسب شدة الألم و تفاعل المريض للألم
ألم مبرح : الجرعة الأولية تكون 100 مغ (أي كبسولتان) متبوعة ب
50 مغ أو 100 مغ (كبسولة أو اثنتين) كل 4 إلى 6 ساعات بدون تجاوز
ملغ في 24 ساعة (8 كبسولات).

ألم مزمن : الجرعة الأولية تكون 50 أو 100 مغ (كبسولة واحدة أو اثنتين)
متبوعة ب 50 مغ أو 100 مغ (كبسولة أو اثنتين) كل 4 إلى 6 ساعات
بدون تجاوز 400 مغ في 24 ساعة (8 كبسولات).

من الضروري أن تكيف الكمية اليومية عند المرضى المصابين بنقص
في الوظيفية الكبدية و الكلوية، و عند المسنين - أكثر من 75 سن
لا يستعمل ترامادول ل س 50 مغ أطول من الوقت اللازم.

في كل الحالات يجب تطبيق بإحكام الوصفة في حالة نقص في
الوظيفة الكبدية: تخفض.

الجرعة الأحادية بالنصف أو تضاعف المدة بين جرعة و أخرى (21 ساعة
في حالة نقص في الوظيفة الكلوية؛ تضاعف المدة بين جرعة و أخرى
(12 ساعة في حالة استصفااء للكرياتين أقل من 30 مل/د) يجب تجنب
ترامادول ل س 50 مغ في حالة استصفااء للكرياتين أقل من 10 مل/د.

في حالة نسيان أخذ جرعة ترامادول ل س 100 مغ لا تأخذوا ضعف الجرعة لتعويض الجرعة المنسية

ما هي التأثيرات الغير المرغوب فيها مع تناول ترامادول ل س 100 مغ ؟

يمكن ظهور اضطرابات نفسية عصبية كالإبهام، إستثنائيا، هلس أو هذيان،
اختلاج خاصة عند المرضى الذين عندهم قابلية لهذه الحالة، اشمزازان
تقيؤ، غثيان، صداع الرأس، دوخة، عرق، جفاف الفم، و في حالة تناول مطول،
ظهور الإمساك نادرا، وجع في البطن، تعب، اضطراب بصري.
نادرا جدا، تفاعلات حساسية، صعوبة في التبول، اضطراب في التنفس،
إدمان، أعراض فطم بعد استعمال مطول مؤديا إلى أعراض مثل: تهيج،
توتر، قلق، أرق، ارتجاف أو اضطرابات هضمية.

كيف يحفظ ترامادول ل س 100 مغ ؟

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال
لا يستعمل هذا الدواء بعد تاريخ بطلانه الموجودة على العب
مقرر تسجيل رقم 08/03F 047/231

التركيب

ترامادول كلورهيديرات 100 ملغ
سوغ 1. ككل كبسولة واحدة

ما هو ترامادول ل س 100 مغ و متى يستعمل ؟

هذا الدواء مسكن للألم. يستعمل لمعالجة الآلام المعتدلة إلى القوية
عند الكبا.

متى ترامادول ل س 100 مغ لا يجب أن يستعمل ؟

ترامادول ل س 50 مغ لا يستعمل في الحالات الآتية :
- فرط الحساسية للمادة ترامادول أو للمواد المرفيني.
- في حالة تسمم حاد للكحول أو الأدوية المنومة، المسكنة أو
المهدئة.
- في حالة قصر تنفسي حاد، أو في حالة قصر كبدي حاد.
- عند الأطفال دون العمر 14 سنة.
- عند المرأة المرضعة.
- في حالة مرض الصرع غير مراقبة بعلاج.
- على العموم، هذا الدواء لا يجب استعماله في حالة الحمل، و مع
الكرهملزين (ضد الصرع)، إلا بأمر من طبيبك.
- استعمال هذا الدواء لفترة طويلة لا يستبعد ظهور حالة لإمان.
و لذا يجب على الطبيب المعالج تحديد مدة العلاج.

عليك أن تعلم طبيبك إذا كنت تشكو من تشنجات أو نوبات صرع أو في
حالة استعمال أدوية أخرى مثل مضادات الإحباط، الأفيونية، أدوية التخدير.
ينصح تجنب تناول الكحول عند استعمال هذا الدواء.
يجب إعلام طبيبك في حالة مرض خطير للكبد أو الكلى.

الحمل

ينصح عدم استعمال هذا الدواء في حالة الحمل. في حالة اكتشاف حالة
الحمل و أنت تستعملين هذا الدواء، استشيري طبيبك في أقرب الآجال
إن الطبيب وحده قادر على تكييف العلاج لحالتك.

الإرضاع

ينصح عدم استعمال هذا الدواء في حالة الرضاعة.

سياقه العربات و استعمالات الآلات

إن هذا الدواء يستطيع التسبب في إحداث غثيان. هذا الخطر يزداد



حامل مقرر التسجيل، مصنع معبئ :
مخابر سالم - مخز 19600 العالمة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر
سالم

رقم ت 08/03F 047/231