

TRAMADOL[®] LS

100 mg suppositoire
Chlorhydrate de Tramadol



FORME ET PRESENTATION:

Suppositoires dosés à 100 mg. Boîte de 10 suppositoires

COMPOSITION:

Tramadol chlorhydrate (DCI) 100 mg

Excipient : glycérides hémi-synthétiques q.s.p. 1 suppositoire

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (Indications thérapeutiques)

Ce médicament est un antalgique (il calme la douleur). Il peut être utilisé sur prescription médicale aussi bien lors d'états douloureux d'apparition soudaine (douleurs dues à des blessures ou à des fractures) que lors d'états douloureux durables (douleurs intenses d'origine neurologique, douleurs dues à une tumeur).

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (Contre-indications)

Ne pas prendre Tramadol LS 100 mg suppositoire dans les cas suivants :

- allergie au tramadol ou aux morphiniques,
- intoxication aiguë ou surdosage avec les produits agissant sur le système nerveux central (alcool, somnifères, autres médicaments contre la douleur...),
- traitement simultané ou récent par certains antidépresseurs,
- insuffisance respiratoire sévère,
- maladie sévère du foie,
- enfant de moins de 15 ans,
- allaitement,
- épilepsie non contrôlée par un traitement (cf. Mises en garde),
- association avec la buprénorphine, la nalbuphine, la pentazocine.

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin :

- pendant la grossesse,
- en association avec la carbamazépine (médicament de l'épilepsie).

MISES EN GARDE:

L'utilisation prolongée de ce médicament peut conduire à un état de dépendance.

Respectez la prescription de votre médecin. Prévenez votre médecin si vous avez déjà présenté des convulsions ou des crises d'épilepsie ou si vous prenez d'autres médicaments comme des antidépresseurs, des neuroleptiques, morphiniques, anesthésique local.

Il est déconseillé de consommer des boissons alcoolisées pendant le traitement.

PRECAUTION D'EMPLOI:

Prévenez votre médecin en cas de maladie grave du foie ou des reins, car il convient alors de modifier la posologie.

Grossesse: L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement: Par mesure de prudence, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

L'attention des conducteurs de véhicules et des utilisateurs de machine est attirée sur le fait que cette spécialité peut entraîner un risque de somnolence. Ce risque est majoré en cas de prise concomitante d'alcool ou de médicaments sédatifs.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

- Possibilité de troubles neuro-psychiques de type confusion et exceptionnellement hallucinations et/ou délire ; convulsions principalement chez des patients prédisposés, nausées, vomissements, somnolence, maux de tête, vertiges, sueurs, sécheresse buccale, et en traitement prolongé, constipation .
- rarement douleurs abdominales, éruption, fatigue, troubles visuels ;
- très rarement réactions allergiques, difficulté pour uriner, troubles de la respiration, dépendance, syndrome de sevrage après une utilisation prolongée entraînant des symptômes tels que : agitation, anxiété, nervosité, insomnie, tremblements et troubles gastro-intestinaux.

COMMENT PRENDRE Tramadol LS 100 mg suppositoire ?

La posologie de TRAMADOL LS 100 mg suppositoire doit être adaptée à l'intensité des douleurs et à la sensibilité du patient à la douleur. Sauf prescription contraire, TRAMADOL LS 100 mg suppositoire doit être pris comme suit:

Dose unique pour les adultes et les adolescents de plus de 15 ans: 1 suppositoire par jour. La dose journalière maximale est de 400 mg de tramadol HCl (soit 4 suppositoires).

Chez les patients ayant une fonction rénale ou hépatique limitée ainsi que chez les patients âgés (en règle générale de plus de 75 ans), le médecin fixera un dosage spécial si nécessaire.

TRAMADOL LS 100 mg suppositoire NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ PLUS LONGTEMPS QUE NECESSAIRE.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

NE PAS LAISSER A PORTEE DES ENFANTS

A CONSERVER A L'ABRI DE LA LUMIERE A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 20°C

N° D.E. : 05/03F 049/231