

Flovenac® 50 et Flovenac® LP 75

Diclofénac 50 mg et 75 mg

COMPOSITION

- Diclofénac sodique50 mg
- Excipients : Alcool isopropylique, povidone, acétone, dibutyl phtalate, hypromellose phtalate, N.P graines q.s.p. 1 gélule.
- Diclofénac sodique75 mg
- Excipients : Sucre sphérique, povidone, éthylcellulose, shellac, talc, éthanol 98% q.s.p. 1 gélule.
- Excipient à effet notoire : Ethanol (Flovenac 75).



FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

- Boite de 20 gélules à microgranules gastro-résistants à 50 mg.
- Boite de 30 gélules à libération prolongée à 75 mg.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l'acide phénylacétique du groupe des acides aryl carboxyliques.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

FLOVENAC® est un anti-inflammatoire non stéroïdien possédant des propriétés : antirhumatismale, anti-inflammatoire, analgésique et antipyretique. Il est indiqué pour le traitement des douleurs inflammatoires dans la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose, l'arthrite chronique juvénile, spondylarthrite ankylosante, les syndromes douloureux de la colonne vertébrale, la goutte aiguë, les douleurs post-traumatiques, les inflammations et les œdèmes postopératoires (ex : chirurgie dentaire ou orthopédique), dysménorrhée primaire et comme adjuvant thérapeutique dans les douleurs inflammatoires sévères des infections ORL comme les pharyngites et amygdalites ou les otites.



CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité au Diclofenac de sodium.
 - Ulcère gastroodésinal actif.
 - Insuffisance hépatocellulaire sévère.
 - Insuffisance rénale sévère.
 - Insuffisance cardiaque sévère.
 - Troubles de l'hémostase.
 - Patients chez qui la prise d'aspirine ou autres produits AINS a déjà provoqué une crise d'asthme aiguë, d'urticaire ou de rhinite allergique.
 - Enfant de moins de 15 ans (en raison du dosage inadapté de ce médicament).
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**



INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, notamment avec les anticoagulants oraux, les autres AINS y compris les salicylés à fortes doses, l'héparine, le lithium, la méthotrexate (dose supérieure à 15 mg/semaine); **il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.**



MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le Diclofenac doit être administré avec précaution chez les patients présentant des antécédents de maladies gastroodésinales ou d'hémorragies digestives; chez les patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique sévère; chez les patients prenant un diurétique et autres



AINS ou des corticostéroïdes. Ainsi que chez les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite chronique et/ou à une polyposse nasale, ont un risque de manifestation allergique, lors de la prise de l'aspirine et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdiens.

En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie, ou de grossesse.

Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.



GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : Ce médicament est déconseillé à partir du 5^{ème} mois de grossesse.

Allaitement : Par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.



COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT

Mode et voie d'administration

Voie orale. Ce médicament est pris de préférence au milieu des repas afin de limiter les effets digestifs indésirables.

Posologie

• Gélule à 50 mg :

Adulte :

* Rhumatologie :

- Traitement des poussées aiguës : 150 mg pendant 7 jours maximum, soit 1 gélule à 50 mg 3 fois par jour pendant 7 jours.

- En cas de crise aiguë, il est conseillé de prendre les gélules avant les repas.

- Traitement d'entretien (ou d'emblée chez certains malades) : 75 à 100 mg par jour, soit 2 gélules à 50 mg par jour, en 2 ou 3 prises.

* Dysménorrhée essentielle : 100 mg par jour en 2 prises, soit 1 gélule à 50 mg matin et soir.

• Gélule LP à 75 mg :

- Traitement d'entretien : 1 gélule LP à 75 mg par jour.

Quand les symptômes sont plus prononcés durant la nuit, il est conseillé de prendre la gélule le soir.

- Traitement des poussées aiguës : 1 gélule LP à 75 mg matin et soir pendant 7 jours maximum.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

SURDOSAGE

Le surdosage peut entraîner : céphalées, agitation motrice, secousses musculaires, irritabilité accrue, ataxie, vertiges, convulsions, surtout chez l'enfant en bas âge, douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée, ulcère gastroodésinal, troubles de la fonction hépatique, oligurie.



EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tout principe actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants:

Ce médicament est généralement bien toléré. Les effets secondaires sont rares et légers à type de dyspepsie, nausée, réactions cutanées et symptômes mineurs du système nerveux central.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.



CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas 30°C. Ne pas laisser à la portée des enfants.

LISTE II

Date de révision de la notice : Décembre 2010.

D.E Algérie N° (Flovenac® 50) : 11/05/04B006/293

D.E Algérie N° (Flovenac® LP75) : 10/04B037/293

Fabricant et détenteur de D.E: Les Laboratoires BIOCARE,
R.N.44 Sidi Kassi Ben M'Hidi El Taref - ALGERIE.

