

ALPROFENE®

Kétoprofène 100mg

ألبروفان®
كيتوبروفان 100مغ

FORME ET PRESENTATION

Suppositoires dosés à 100 mg. Boite de 10 suppositoires.

COMPOSITION

Kétoprofène (DCI) 100 mg
Excipients glycérides hémissynthétiques q.s.p. 1 suppositoire

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Alprofène 100 mg est un anti-inflammatoire non stéroïdien doté d'un effet analgésique et antipyrétique.

Il est réservé à l'enfant à partir de 15 ans et à l'adulte. Il est préconisé en traitement de longue durée dans les rhumatismes articulaires chroniques et certaines arthroses sévères. En traitement de courte durée, il est indiqué dans le traitement de certaines inflammations articulaires (tendinite, bursite, douleur aiguë de l'épaule), de douleur aiguë d'arthrose, de douleurs lombaires (douleur du bas du dos), des inflammations de la goutte et des douleurs aiguës du nerf sciatique.

CONTRE-INDICATION

Alprofène 100 mg ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- A partir du sixième mois de grossesse, et chez la femme allaitante.
- Antécédent d'allergie ou d'asthme aux anti-inflammatoires non stéroïdiens tel que l'Aspirine.
- Ulcère gastro-duodéal en évolution ; en cas d'inflammation ou de saignements récents du rectum.
- Maladie grave du foie ou des reins.
- Enfant de moins de 15 ans.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il est important de prévenir votre médecin en cas d'antécédents digestifs, de maladie du cœur, du foie ou du rein, d'asthme, de contraception par stérilet.

Signaler systématiquement tout autre médicament en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conducteurs de véhicules et utilisateurs de machines : dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et une somnolence.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Prévenir votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

- Grossesse : vous ne devez en aucun cas prendre ce médicament à partir de sixième mois de grossesse.
- Allaitement : ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il n'est pas recommandé de l'utiliser pendant l'allaitement.

POSOLOGIE

1 à 3 suppositoires par jour à répartir en 1 à 3 prises.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONDITION DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.

CONDITIONS DE DELIVRANCE

Liste II

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE

septembre 2015

شكل و تقديم

تحميلات ب 100 مغ. علبه ب 10 تحميلات.

التركيب

كيتوبروفين (ت.م.د) 100 مغ
سواغ غليسريد نصف تركيبي ك.ك.ل 1 تحميله

دواعي الاستعمال

البروفين هو مضاد للالتهاب غير ستيرويدي , مضاد للألام و الحمى , يوصى باستعمال هذا الدواء عند البالغين و الأطفال ابتداء من 15 سنة. لمعالجة طويلة المدى للأمراض الرثية المزمنة و بعض أمراض المفاصل الشديدة. ينصح في معالجة قصيرة المدى لبعض الالتهابات (التهاب الوتر التهاب الجراب, ألم كتف حاد) , نوبات الألم الحاد في داء المفاصل , الألام القطنية (ألم أسفل الظهر), التهابات المفاصل الناتجة عن التقرس و الألام المرتبطة بالتهاب الأعصاب مثل عصب عرق النساء.

موانع الاستعمال

يمنع استعمال البروفين 100 مغ في الحالات التالية :

- ابتداء من الشهر السادس من الحمل, و عند المرأة المرضعة.
- فرط الحساسية أو ريو ظهر بسبب تناول مضادات الالتهاب غير ستيرويديه كالأسبرين.
- القرحة المعدية, التهاب أو نزيف الدم في الشرج.
- مرض خطير للكبد أو الكلى.
- عند الأطفال اقل من 15 سنة.

احتياطات الاستعمال

من الضروري إبلاغ الطبيب المعالج في حالة وجود سوابق لمشاكل هضمية, أمراض قلبية , كبدية أو كلوية, ريو , أو استعمال لولب لمنع الحمل. من أجل تفادي أي تداخلات دوائية , يجب إبلاغ الطبيب المعالج أو الصيدلي بكل دواء اتم بصدد التداوي به. السائقون و مستعملوا الآلات : نادرا ما يسبب تناول هذا الدواء دوارا أو نعاسا.

الحمل و الإرضاع

يجب إبلاغ الطبيب في حالة الحمل أو الإرضاع.

- الحمل : لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمال هذا الدواء ابتداء من الشهر السادس للحمل.
- الرضاعة : يمر هذا الدواء إلى حليب الأم, لذا من باب الاحتياط لا ينصح باستعماله أثناء فترة الرضاعة.

الاستعمال و المقادير

1 إلى 3 تحميلات في اليوم , و على أي حال يجب التقيد بوصفة الطبيب .
في كل الحالات يجب الامتنال للوصفة الطبية.

شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

شروط الاستطباب

قائمة II

تاريخ تحديث النشرة

سبتمبر 2015



LABORATOIRES
SALEM

Détenteur de la DE, Fabricant, Conditionneur :
LABORATOIRES SALEM - Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE
www.labosalem.com

حامل مقرر التسجيل, مصنع معين :
مخابر سالم - م.ص 19600 العلمة - الجزائر
www.labosalem.com

محابر
سالم