



Piroxen® dispersible 20 mg Piroxicam

1. QU'EST CE QUE PIROXEN DISPERSIBLE 20mg ?

Forme pharmaceutique.

PIROXEN dispersible 20 mg se présente sous forme de comprimé dispersible rond légèrement jaunâtre.

Classe pharmaco-thérapeutique.

Anti-inflammatoire non stéroïdien (N : Système nerveux central).

Composition.

Chaque comprimé contient :

Piroxicam.....20 mg

Excipients: Cellulose micro cristalline, Carboxyméthyl amidon sodique (Type A), Silice colloïdale anhydre, Stéarate de magnésium..... q.s.p. un comprimé.

2. DANS QUELS CAS UTILISER PIROXEN DISPERSIBLE 20mg ? (Indications thérapeutiques)

PIROXEN est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans dans le traitement de:

Au traitement symptomatique de longue durée :

- Des rhumatismes inflammatoires chroniques.
- De certaines arthroses douloureuses et invalidantes

Au traitement symptomatique de courte durée de:

- De Certaines inflammations des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aigüe).
- Des poussés douloureuses d'arthroses.
- Des affections aigües post-traumatiques de l'appareil locomoteur.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE PIROXEN DISPERSIBLE 20mg ?

Contre indications

CE MEDICAMENT ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:

- Allergie connue au Piroxicam ou à l'un des autres constituants ou aux substances d'acidité proche telles qu'autres AINS, aspirine.
- Ulcère gastroduodénal en évolution.
- Insuffisance hépatocellulaire sévère.
- Insuffisance rénale sévère.
- Enfant de moins de 15 ans.

- Femme enceinte (à partir du 6^e mois) et la femme qui allaite.

Mises en garde spéciales

Ce médicament ne doit être pris que sous surveillance médicale.

Prévenir votre médecin en cas:

- D'antécédent d'asthme associé à: une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez.
- L'administration de ce produit peut entraîner une crise d'asthme.
- De traitement anticoagulant concomitant ce médicament peut entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.

Précautions d'emploi

En raison de la nécessité d'adapter le traitement, il est important de prévenir votre médecin qui rédige l'ordonnance en cas:

- Des antécédents digestifs (ulcère gastroduodénal, hernie hiatale, hémorragies digestives...)
- De maladie du cœur , du foi ou du rein.
- D'asthme: la survenue de crise d'asthme chez certains sujets peut être liée à une allergie à l'aspirine ou autres AINS.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 premiers mois de grossesse que sur le conseil de votre médecin.

- A partir du 6^e mois de grossesse vous ne devez en aucun cas prendre de vous-même ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardiopulmonaire et rénal et cela même avec une seule prise
- Il peut arriver toutefois, dans des cas très particuliers, que votre gynécologue vous prescrive ce médicament .dans ce cas respectez strictement l'ordonnance de votre médecin.
- Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

Conducteurs et utilisateurs de machines

Dans de très rare cas, la prise de ce médicament peut entraîner vertige et somnolence.

Interactions médicamenteuse et autres interactions

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments notamment avec l'anticoagulant oral, les autres AINS y compris l'aspirine et ses dérivés à fortes doses, l'héparine injectable, le lithium, le méthotrexate, il faut signaler tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. COMMENT UTILISER PIROXEN DISPERSIBLE 20mg ?

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels ou dissous dans un grand verre d'eau. Ils doivent être pris au cours d'un repas.

Posologie

Selon les indications la posologie habituelle est de 1 à 2 comprimés par jour. Ne pas dépasser 2 comprimés / jour. Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin

Conduite à tenir en cas de surdosage

Transfert immédiat en milieu hospitalier, le patient subit un lavage gastrique et un traitement par le charbon activé.

5. QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS ?

Comme tout produit actif, ce médicament peut entraîner chez certaines personnes des effets plus au moins gênants.

Il faut avertir votre médecin si vous présentez :

Des douleurs d'estomac, des vomissements, des nausées, des vertiges, des somnolences, un ulcère, une crise d'asthme
De rares cas surviennent où il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin:
Manifestation cutanée ou muqueuse inhabituelle (éruption, démangeaison, rougeur, aphte, conjonctivite). Hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, ou coloration noire des selles).

6. COMMENT CONSERVER PIROXEN DISPERSIBLE 20mg ?

Se conserve à l'abri de la chaleur et de l'humidité et de la lumière. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le conditionnement extérieur.

7. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE ?

Liste I, sous ordonnance médicale.

8. PRESENTATION ET NUMERO DE D.E.

Spécialité	Présentation	N° D.E.
PIROXEN Dispersible 20mg	Boîte de 12 Comprimés	10 / 04 B02Z/ 317

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E
 Les laboratoires INPHA-Médic
 Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
 Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.

Date de dernière mise à jour : Janvier 2010