

DOMPERIDONE BGL 30

La substance active est :

Domperidone.....1mg pour 1 ml de suspension buvable.

Les autres composants sont :

Polysorbate 20, hydroxyde de sodium, cellulose microcristalline et carmellose sodique, sorbitol à 70% (non cristallisable), parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, saccharine sodique, eau purifiée.

1. QU'EST CE QUE DOMPERIDONE BGL 1 mg/ml, suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme d'une suspension buvable en flacon de 200 ml avec une seringue pour administration orale.

Ce médicament contient de la domperidone, substance appartenant à la famille des antagonistes de la dopamine. Il agit sur la motricité gastrique.

- Chez l'adulte, il est indiqué dans le soulagement des nausées et vomissements, sensations de ballonnements, gênes ou régurgitations gastriques (remontées du contenu de l'estomac dans la bouche).

- Chez l'enfant, il est indiqué dans le soulagement des nausées et vomissements.

QUELS SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOMPERIDONE BGL 1 mg/ml, suspension buvable.

Ne prenez jamais DOMPERIDONE BGL 1 mg/ml, suspension buvable dans les cas suivants :

- allergie connue à la domperidone ou à l'un des autres composants de ce médicament (voir composition)

- prolactinome (maladie de la glande hypophysaire).

- saignements de l'estomac ou de l'intestin, obstruction mécanique ou perforation digestive.

Faites attention dans les cas suivants :

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au sorbitol (maladie métabolique héréditaire).

Prévenir votre médecin si vous souffrez d'une insuffisance hépatique (défaillance des fonctions du foie).

Prévenir votre médecin si vous prenez du kétoconazole par voie orale, utilisé pour traiter les infections dues à des champignons microscopiques (mycoses).

Ce médicament sera utilisé AVEC PRECAUTION en cas d'insuffisance rénale (défaillance des fonctions du rein), en cas de traitement prolongé, votre médecin sera amené à vous suivre régulièrement.

Ce médicament contient 0.18 mg de sodium par ml de suspension : en tenir compte chez les personnes suivant un régime pauvre en sel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si ce médicament vous est prescrit au cours de la grossesse, respectez la posologie et la durée du traitement établies par votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament au cours de l'allaitement est déconseillée. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable : sorbitol, sodium.

3-COMMENT PRENDRE DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable ?

Posologie :

La posologie usuelle chez les adultes est de 10 ml /prise jusqu'à 3 fois par jour sans dépasser 30 ml/jour, est de 0,25 mg/kg par prise chez les nourrissons, enfants (moins de 12 ans) et adolescents de moins de 35 kg, elle peut être administrée jusqu'à 3 fois par jour sans dépasser 0,75 mg/kg par jour.

DANS TOUS LES CAS, RESPECTER STRICTEMENT L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez l'impression que l'effet de DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable, est trop fort ou trop faible : consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Durée du traitement :

La durée initiale du traitement est de 7 jours. Si les symptômes persistent après 7 jours, consultez votre médecin qui évaluera la nécessité de poursuivre le traitement. Dans tous les cas, respecter strictement l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration : Voie orale

Il est recommandé de prendre ce médicament avant les repas. Si le médicament est pris après les repas, son absorption est quelque peu retardée.

MODE D'EMPLOI DE LA SERINGUE POUR ADMINISTRATION ORALE

Par exemple, si votre médecin prescrit :

UNE DOSE CORRESPONDANT AU POIDS DE L'ENFANT PAR PRISE :

La dose à administrer est obtenue en aspirant la suspension en tirant le piston de la seringue pour administration orale jusqu'à la graduation correspondant au poids de l'enfant.

- **enfant jusqu'à 20 kg :** remplir la seringue jusqu'à la graduation correspondant au poids de l'enfant.

- **enfant de plus de 20 kg :** remplir une première fois la seringue jusqu'à la graduation 20 kg, puis une deuxième fois jusqu'à atteindre la graduation permettant d'atteindre un total égal au poids de l'enfant.

Par exemple, pour un enfant de 35 kg : remplir une première fois la seringue jusqu'à la graduation 20 kg puis une deuxième fois jusqu'à la graduation 15 kg

Parfois votre médecin peut étre amené à prescrire une posologie supérieure.

DEUX DOSES CORRESPONDANT AU POIDS DE L'ENFANT PAR PRISE :

Dans ce cas, il est nécessaire de répéter l'opération décrite ci-dessus une deuxième fois pour chaque prise.

L'usage de la seringue pour administration orale est strictement réservé à l'administration de cette suspension de domperidone chez le nourrisson et l'enfant de moins de 12 ans

La seringue pour administration orale doit être démontée, rincée et séchée après chaque utilisation.

Si vous avez pris plus de DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4-QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- très rares : réactions allergiques incluant réactions allergiques subites et sévères, urticaire et œdème de Quincke, effets secondaires extrapyramidaux (modification de la tonicité des muscles et de la régulation des mouvements involontaires et automatiques), diarrhée, prurit, rash.

- rares : augmentation des taux de prolactine (hormone qui provoque la lactation), galactorrhée (écoulement de lait en dehors des périodes d'allaitement), gynécomastie (développement anormal des seins chez l'homme), aménorrhée (troubles des règles), troubles gastro-intestinaux, y compris des crampes intestinales très rares et passagères.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5-COMMENT CONSERVER DOMPERIDONE 1 mg/ml, suspension buvable ?

Après la première ouverture, conserver le médicament pendant 3 mois maximum.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.