DÉBRIDAT

trimébutine

Granulé pour suspension buvable en flacon

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :
Trimébutine ..... 0,787 g
Excipient : saccharose, polysorbate 80, arôme orange, jaune orangé S (E 110) ..... qsp 100 g
FORME PHARMACEUTIQUE :
Granulés pour suspension buvable en flacon, boîte de 1 flacon de 250 ml contenant 152,5 g de granulés.
CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :
ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE (A : Appareil digestif et métabolisme)
DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Ce médicament est indiqué dans les douleurs des maladies digestives ou biliaires. Il corrige les troubles du transit associés.
ATTENTION !
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
En cas de diabète, tenir compte de la teneur en sucre : une graduation de 5 ml du godet doseur contient 3 g de saccharose.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
GROSSESSE - ALLAITEMENT :
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. L'allaitement est possible lors d'un traitement par ce médicament.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L' ALLAITEMENT, IL CONVIENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D' UTILISER UN MÉDICAMENT.
LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS : Saccharose, jaune orangé S.
COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?
POSOLOGIE
Chez l'adulte : 1 graduation du godet doseur de 15 ml 3 fois/jour. Exceptionnellement cette posologie peut être augmentée jusqu'à 6 graduations du godet doseur de 15 ml par jour.
Chez l'enfant, les doses usuelles sont :
Jusqu'à 6 mois : 1 graduation du godet doseur de 2,5ml, 2 à 3 fois par jour;
De 6 mois à 1 an : 1 graduation du godet doseur de 5 ml, 2 fois par jour;
De 1 à 5 ans : 1 graduation du godet doseur de 5 ml 3 fois par jour;
Au-dessus de 5 ans : 1 graduation du godet doseur de 10 ml 3 fois par jour, soit environ 1 graduation du godet doseur de 5 ml par 5 kg de poids et par jour.
MODE D'ADMINISTRATION :
Voie orale. La suspension peut être administrée directement à l'aide du godet doseur ou mélangée à un liquide. Chez les nourrissons, elle peut être introduite dans un biberon d'eau ou de lait.
Rincer soigneusement le godet doseur après usage.



Préparation de la suspension buvable instantanée :
1) Introduire de l'eau minérale non gazeuse ou bouillie refroidie jusqu'au repère (trait de jauge sur le flacon).
2) Fermer le flacon et agiter jusqu'à obtention d'un mélange homogène. La suspension est prête à l'emploi. Il convient d'agiter le flacon avant chaque emploi.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ : Au cours des principaux repas.
CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :
EN CAS DE SURDOSAGE, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.
EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES) :
COMME TOUT PRODUIT ACTIF CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : rares réactions cutanées.
SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.
CONSERVATION :
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :
Après reconstitution, la suspension buvable ne doit pas être conservée plus de 4 semaines.
PRÉSENTATION : Granulé pour suspension buvable en flacon de 250 ml.
Médicament enregistré n° 97/10F 052/045
Date de révision de la notice : Avril 1999

Ceci est un médicament
- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

VOTRE MÉDECIN, VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES MÉDICAMENTS, N'HÉSITEZ PAS À LEUR DEMANDER DES PRÉCISIONS.
Liste II.

Pfizer

Detenteur d'AMM:
23-25, Avenue du Dr.Lannelongue
75014 PARIS - France
Fabriqué par: Farmea
10 Rue Bouché Thomas, Zac Sud
d'Orgemont 49007 Angers - France
Importé par: Pfizer Pharm Algérie
Z.I de Rouiba, Alger Algérie

21063