

FORME ET PRESENTATION

Suppositoires. Boîte de 6

Composition	Par suppositoire
- Bisacodyl (DCI)	10 mg
	Ou 5 mg

Excipient : glycérides hémi-synthétiques

q.s.p. 1 suppositoire

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (Indications thérapeutiques)

Ce médicament est préconisé dans certaines formes de constipation et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (Contre-indications)

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- allergie connue à ce composant
- certaines maladies de l'intestin et du côlon (recto-colite et autre maladie inflammatoire)
- douleur abdominale (douleur du ventre)
- constipation chronique (constipation de longue durée).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPECIALES

LAXADYL ne doit pas être utilisé de façon prolongée (supérieure à 10 jours) sans avis médical

- **Constipation occasionnelle** : elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage, changements dans le rythme de travail, ...). LAXADYL peut être d'une aide en traitement court. Cependant, si la constipation ne peut pas s'expliquer par des changements de mode de vie, si elle est accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre, il est impératif de demander l'avis de votre médecin.

- **Constipation de longue durée (chronique)** : elle ne doit pas être traitée par un laxatif stimulant.

Elle peut être due soit à une maladie de l'intestin qui nécessite l'intervention d'un médecin, soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie. Dans ce cas, le traitement comporte entre autres, une augmentation des apports alimentaires en

produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, etc..), une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits, de l'activité physique, une rééducation du réflexe de défécation.

Cas particulier chez l'enfant : chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique : utilisation de quantités d'eau suffisantes avec les poudres de lait infantile, alimentation riche en produits d'origine végétale, jus de fruits.

Le traitement par un laxatif stimulant sans avis médical est déconseillé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas de diarrhées ou de douleurs abdominales, la prise du médicament doit être suspendue.

En cas de poussée hémorroïdaire, de fissure anale ou de recto-colite hémorragique l'utilisation de LAXADYL est déconseillée.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants, notamment sensations de brûlures anales.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENTS ?

Posologie :

- **Enfant de 4 ans et plus**: 1 suppositoire de LAXADYL 5 mg par jour, une demi heure avant l'heure choisie pour l'évacuation intestinale.

- **Adulte et enfant à partir de 6 ans**:

1 suppositoire de LAXADYL 10 mg par jour, une demi heure avant l'heure choisie pour l'évacuation intestinale.

Mode et voie d'administration : Voie rectale

Durée du traitement : ne pas dépasser 10 jours de traitement sans avis médical.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 30°C.