

# GLYCERINE LS<sup>®</sup> Suppositoire

Adulte / Enfant / Bébé  
1.80g & 1.20g & 0.72 g  
Glycérol

## FORME et PRÉSENTATION :

Suppositoire translucide : Boites de 10, sous plaquettes thermoformées.

**COMPOSITION :** par suppositoire

	GLYCERINE LS Bébé	GLYCERINE LS enfant	GLYCERINE LS Adulte
Glycérol	0.72 g	1.20 g	1.80 g
Excipients	Q.S.P. 1 Suppositoire		

**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :** Laxatif par voie rectale

• Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire (rectocolite ulcéreuse, maladie de CROHN).

## INDICATIONS :

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation basse notamment par dyschésie rectale, ainsi que dans la préparation aux examens endoscopiques du rectum.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Mode et voie d'administration: Voie rectale.

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction

Posologie:

- Constipation:
  - Adulte : 1 suppositoire Glycérine LS adulte 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération à renouveler dans la demi-heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.
  - Enfant :
  - Enfants de 2 à 6 ans : 1 suppositoire Glycérine LS enfant 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.
  - Enfant de plus de 6 ans : 1 suppositoire Glycérine LS enfant 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération, à renouveler éventuellement dans la demi-heure qui suit en cas de constipation rebelle.
  - Nourrison : La posologie dans le traitement de la constipation basse usuelle est d'un suppositoire Glycérine LS bébé 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération, avec interruption de 24 heures tous les 3 jours.

- Examen endoscopique:  
La posologie dans la préparation aux examens endoscopiques du rectum est d'un suppositoire de Glycérine LS 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour l'exonération.

**Durée de traitement:** le traitement de la constipation ne doit pas, en moyenne, dépasser 10 jours.

**CONTRE-INDICATIONS :** Ce médicament est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au glycérol ou à l'un des autres composants
- Colopathie obstructive, compte tenu de l'effet laxatif du médicament.

## MISES EN GARDE:

Une utilisation prolongée est déconseillée.

Chez l'enfant, la prescription de laxatifs par voie rectale doit être exceptionnelle: elle doit prendre en compte le risque d'entraver le fonctionnement normal du réflexe d'exonération. Le traitement médicamenteux de la constipation n'est qu'un adjuvant au traitement hygiéno-diététique :

- enrichissement de l'alimentation en fibres végétales et en boissons.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser ce médicament dans les cas de crises hémorroïdaires, de fissures anales, de rectocolites hémorragiques et de maladie colique.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Absence de données cliniques. Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. Demander conseil à votre médecin ou pharmacien avant l'utilisation de ce médicament.

## EFFETS INDESIRABLES :

Un usage prolongé peut occasionner des sensations de brûlure anale et exceptionnellement des inflammations du rectum.

## SURDOSAGE :

En cas d'utilisation excessive ou prolongée, risque accru de rectites et de diarrhée. Arrêter le traitement ou diminuer la posologie. Il faut rétablir l'équilibre hydroélectrolytique pour éviter la déshydratation.

## CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

DE: Bébé :14/10M 124/231  
Enfant :14/10M 069/231  
Adulte :14/10M 070/231