Lapeti®

CYPROHEPTADINE 4 mg
comprimé/boite de 20

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

Dénomination : LAPETI® 4 mg .

Forme pharmaceutique : comprimé boite de 20 .

Composition :

Cyproheptadine(DCI)..... 4 mg

Excipients: calcium hydrogène phosphate amidon de mais, gélatine, talc , stéarate de magnésium .

Excipient à effet notoire: lactose .

Classe pharmacologique: Antihistaminique.

DANS QUEL (S) CAS UTILISER LAPETI® ?

Votre médecin vous a prescrit Lapéti® pour le traitement symptomatique des manifestations allergiques: rhinite, conjonctivite, urticaire.

DANS QUEL (S) CAS NE PAS UTILISER LAPETI®?

- Hypersensibilité à l'un des composants.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Risque de rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques.
- Antécédents d'agranulocytose.
- Enfant de moins de 6 ans.

-Pendant la grossesse et en cas d'allaitement.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE/ PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes (détresse respiratoire, oedème, lésions cutanées) ou de signes associés d'affection virale et d'apparition de fièvre, d'angine ou d'une autre infection, il faut avertir votre médecin.

La cyproheptadine doit être utilisée avec prudence chez le sujet âgé, présentant une plus grande sensibilité à l'hypotension orthostatique, aux vertiges et à la sédation, une constipation chronique, une éventuelle hypertrophie prostatique, en cas d'ulcère peptique sténosant et d'obstruction pyloroduodénale, en cas d'insuffisance rénale sévère.

La prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool pendant le traitement est fortement déconseillée.

La cyproheptadine peut entraîner une réaction faussement positive des tests de recherche d'antidépresseurs tricycliques dans les urines.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Déconseillées :

Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif des antihistaminiques H 1.

A prendre en compte :

- Autres dépresseurs du système nerveux central : dérivés morphiniques, benzodiazépines, barbituriques, anxiolytiques autres que benzodiazépines, hypnotiques, neuroleptiques, antidépresseurs sédatifs, antihypertenseurs centraux, baclofène, thalidomide : majoration de la dépression centrale.
- Atropine et autres substances atropiniques addition des effets indésirables atropiniques à type de rétention urinaire, constipation, sécheresse des muqueuses.
- Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine : risque de diminution de l'efficacité de l'antidépresseur.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement a votre médecin ou a votre pharmacien tout autre traitement en cours.

GROSSESSE / ALLAITEMENT : déconseillé.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER LAPETI® ?

Posologie: Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Adulte : 1 comprimé 3 fois par jour sans dépasser 5 comprimés par jour.

Enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Il convient de privilégier les prises avant le coucher en raison de l'effet sédatif de la cyproheptadine.

Mode d'administration : voie orale.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants.

- Sédation ou somnolence plus marquée en début de traitement, incoordination motrice, tremblements, troubles de l'équilibre, vertiges, hypotension orthostatique, sécheresse des muqueuses, constipation, troubles de l'accommodation, mydriase, palpitations cardiaques, rétention urinaire, tarissement de la sécrétion lactée, excitation, nervosité, insomnie, agitation, comportement agressif, confusion mentale, hallucinations, baisse de la mémoire ou de la concentration plus fréquente chez le sujet âgé.
- Leucopénie, neutropénie, agranulocytose, thrombocytopén anémie hémolytique.
-Anomalies du bilan hépatique, insuffisance hépatique, ict hépatite cholestatique et/ou cytolytique.
-Augmentation de l'appétit/prise de poids.
-Erythèmes, purpura, urticaire, oedème, plus rarement oedème de Quincke, choc anaphylactique.

Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tou effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionn dans cette notice.

SURDOSAGE :

Symptômes: convulsions, arrêt cardio-respiratoire, troubles la conscience, coma.

Prévenez immédiatement un médecin en cas de prise massive de ce médicament.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

L'attention est attirée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabricant détenteur de DE :
GROUPE SANTE LABORATOIRES
Zone parcs et sièges N° 01, Zéralda, Alger- Algérie.

www.groupesantelaboratoires.com

DE: 10/14F 025/242

Date de révision de la notice: 2013

Groupe Santé

لابيتي®

سيبروهيبتادين 4مغ
أقراص / علبة 20

تعريف الدواء:

التسمية: لابيتي® 4مغ.

الشكل الصيدلاني: أقراص . علبة ذات 20.

التركيب:

سيبروهيبتادين (DCI)..... 4مغ

السواغات : كالسيوم هيدروجين فوسفات، نشاء الذرة، جيلاتين، ستيارات المغنزيوم، طلك ، سواغ معروف التأثير : لاكتوز .

الزمرة الدوائية العلاجية : مضاد الهيستامين.

في أية حالة (حالات) يستعمل لابيتي؟

وصف لك طبيبك لابيتي® لعلاج مظاهر الحساسية: التهاب الغشاء المخاطي للأنف، التهاب الملتحمة، شرى .

في أية حالة (حالات) لا يستعمل لابيتي® ؟

- حساسية لأحد المكونات.
- خطر زرق العين بانغلاق الزاوية .
- خطر الاحتباس البولي المرتبط باضطرابات احليلية بروستاتية.
- سوابق نقص الكريات البيضاء.
- الطفل الأقل من 6 سنوات.
- خلال الحمل أو الرضاعة.

في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال :

في حالة استمرار أو تفاقم الأعراض (ضيق التنفس ، وذمة ، اصابات جلدية)أو في حالة وجود علامات مرتبطة بعدوى فيروسية وظهور الحمى، الذبحة اللوزية أو عدوى أخرى ، لا بد من إخبار الطبيب فورا.

ينبغي أن تستخدم سيبروهيبتادين بحذر عند المسنين، ذوي حساسية كبيرة تجاه انخفاض ضغط الدم الوقوفي، الدوار، التنوم، في حالة الإمساك المزمن، و احتمال تضخم البروستات في حالة قرحة معوية انسدادية، تضيق معدي معوي أو في حالة القصور الكلوي الحاد .

ينصح بعدم استعمال المشروبات الكحولية والأدوية التي تحتوي على الكحول أثناء فترة العلاج.

يمكن أن يؤدي سيبروهيبتادين إلى رد فعل ايجابي خاطىء لفحوص البحث لمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات في البول.

بسبب احتوائه على اللاكتوز، لا يستعمل هذا الدواء في حالة وجود الغلاكتوز في الدم خلقي، متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز والغلاكتوز أو نقص اللاكتاز

تفاعلات دوائية:

غير منصوحة :

الكحول لأنه يزيد من مفعول الترنيق الناتج عن مضادات الهيستامين.

الأخذ بعين الإعتبار:

- أدوية أخرى تحدث اختلالات بالجهاز العصبي المركزي: مشتقات المورفين، بنزوديازبين، باربيتوريك مضادات القلق غير بنزوديازبين ، منومات، مهدئات الأعصاب، مضادات الانهيارات العصبية ذات مفعول ترنيق، مضادات ارتفاع الضغط الشرياني ذات مفعول مركزي، باكلوفان، تاليدوميد، زيادة الانهيارات ذات مفعول مركزي، أتروبين و مواد أخرى اتروبينية، زيادة الأعراض غير المرغوب فيها الأتروبينية مثل الاحتباس البولي، إمساك ، جفاف المخاطية ، مثبطات إعادة إلتقاط السيروتونين، خطر نقص مفعول مضادات الانهيار.

لتفادي احتمال تفاعلات دوائية بين العديد من الأدوية، يجب إحاطة الطبيب أو الصيدلي تلقائيا بكل علاج آخر تخضع له.

الحمل/ الرضاعة، غير منصوح

عموما، ينصح دائما باستشارة الطبيب أو الصيدلي أثناء فترة الحمل أو الرضاعة قبل بداية استعمال أي دواء .

كيف يستعمل لابيتي® ؟

المقادير:

للبالغ و الطفل ما فوق 6 سنوات.

البالغ: قرص 3 مرات في اليوم دون تجاوز 5 أقراص في اليوم .

الطفل الأكثر من 6 سنوات: قرص مرتين الى 3 مرات في اليوم .

يستحسن تناول سيبروهيبتادين مساءا بسبب تأثيره المهدئ .

طريقة الاستعمال: عن طريق الفم

التأثيرات غير المرغوب فيها أوالمزعجة :

مثل كل مادة فعالة، قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص تأثيرات نوعا ما مزعجة:

- التخدير أو النعاس خاصة في بداية العلاج عدم تناسق الحركات، ارتعاش، اختلال التوازن، دوخة، انخفاض ضغط الدم الوقوفي، جفاف الأغشية المخاطية، إمساك، اضطرابات إقامة العين، تمدد حدقة العين، خفقات القلب ، احتباس البول، نضوب إفراز الحليب،إثارة، عصبية ، أرق، هيجان، سلوك عدواني ، ارتباك عقلي ، هلوسة، انخفاض الذاكرة أو التركيز أكثر شيوعا عند المسنين.

.نقص الكريات البيض ، قلة العدلات ، ندرة المحببات ، قلة الصفيحات ، فقر الدم الانحلالي.

-اختلال النحاليل الكبدية، فشل الكبد ، يرقان، التهاب الكبد الكولستازي و/أو الانحلالي.

- زيادة الشهية / زيادة الوزن.

-حمامي ، فرفرية ، شرى ، وذمة ، ونادرا وذمة وعائية و صدمة تأقي .

في جميع الأحوال لا تترددوا في طلب نصائح من الطبيب أو الصيدلي و إبلاغهما عن كل تأثير غير مرغوب أو مزعج غير مذكور في هذه الوصفة.

الفرط في المقادير:

الأعراض : تشنجات، اضطرابات في التنفس واعتلالات قلبية، اضطرابات ذهنية، غيبوبة .

يجب اخبار الطبيب فورا في حالة الفرط في المقادير.

القيادة / إستعمال الآلات:

نلفت انتباه سائقي السيارات و مستعملي الآلات إلى أخطار النعاس الناجمة عن هذا الدواء.

تزداد هذه الظاهرة بتناول المشروبات الكحولية أو الأدوية التي تحتوي على كحول.

الحفظ:

لا يجوز إستعمال هذا الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية المذكور في الغلاف الخارجي.

يحفظ في درجة حرارة اقل من 25°م.

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

المصنع صاحب مقرر التسجيل: **مخابر مجمع الصحة.**
المنطقة الصناعية رقم 01، زرالدة، الجزائر
www.groupesantelaboratoires.com
رقم مقرر التسجيل : 10/14F025/242

تاريخ مراجعة النشرة 2013

Groupe Santé
Laboratoires