FLUCONAZOLE PFIZER® Gélule **FLUCONAZOLE**

50 mg



Veuillez lire cette notice attentivement et en intégralité avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament yous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les symptôme leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, même s'il n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Voir rubrique 4

Que contient cette notice?

- Qu'est-ce que Fluconazole Pfizer® et dans quel cas est-il utilisé?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Fluconazole Pfizer®? Comment prendre Fluconazole Pfizer®?
- 4 Quels sont les effets indésirables éventuels?
- 5. Comment conserver Fluconazole Pfizer®?
 6. Contenu de l'emballage et autres informations.
- 1. QU'EST-CE QUE FLUCONAZOLE PFIZER® ET DANS QUELS CAS

EST-IL UTILISE? INDICATIONS : ADULTES

Le traitement peut débuter avant que les résultats des cultures et des autres tests de laboratoire soient connus; toutefois, une fois ces résultats disponibles le traitement anti-infectieux devra être adapté en conséquence.

Le Fluconazole Pfizer® (fluconazole) peut être administré pour le traitement des cas suivants :

- Candidoses vaginales, aigué ou récurrente

- Dermatomycoses, dont l'épidermophytie plantaire (tinea pedis), la trichophytie des parties découvertes du corps (tinea corporis), l'eczéma marginé (tinea cruris), l'onychomycose (tinea unguium) et les candidoses dermiques

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNATHE AVANT DE PRENDRE FLUCONAZOLE PFIZER®?

 Ne prenez pas Fluconazole Pfizer® dans les cas suivants :

 Si vous êtes allerique (hypersensible) au fluconazole, à un composé azolé apparenté, à d'autres médicaments que vous avez pris pour traiter les infections fongiques ou à d'autres composants de Fluconazole Pfizer®; les symptômes peuvent inclure démangeaisons, rougissement de la peau et difficulté respications.
- les symptomes peuvent incure demangeaisons, rougissement de la peau et difficultés respiratoires;

 Si vous prenez de l'astémizole ou de la terfénadine; du cisapride; du pimozide; de la quinidine; ou de l'érythromycine.

 Mises en garde et précautions d'emploi
 Signalez à votre médecin si vous :

 avez des problèmes de foie ou de rein,

- avez des probiemes de loie ou de rein,
 souffrez d'une maladie cardiaque, notamment des problèmes de rythme cardiaque
 développez de graves réactions cutanées (démangeaisons, rougissement de la peau ou difficultés respiratoires).
 Interactions médicamenteuses
 Signalez immédiatement à votre médecin si vous prenez de l'astémizole, de la

terfenadine, du cisapride, du pimozide, de la quinidine ou de l'érythromycine, car ces médicaments ne doivent pas être administrés avec Fluconazole Pfizer[®] (voir rubrique : « Ne prenez pas Fluconazole Pfizer[®] dans les cas suivants »). Certains médicaments peuvent interagir avec Fluconazole Pfizer[®] Signalez impérativement à votre médecin si vous prenez l'un des médicaments sui - rifampicine ou rifabutine,

- alfentanii, fentanyi, amitriptyline, nortriptyline, amphotéricine B, voriconazole, médicaments qui fluidifient le sang pour empêcher les caillots sanguins (warfarine ou médicaments similaires), benzodiazépines (midazolam, triazolam ou médicaments similaires contre l'insomnie ou l'anxiété),

- iniscinité du faincier, carbamazépine, phénytoïne (contre l'épilepsie), nifédipine, isradipine, amlodipine, félodipine et losartan (contre l'hypertension artérielle),
- Triybe tension a autentelle, ciclosporine, sirolimus ou tacrolimus (contre le rejet des organes transplantés), cyclophosphamide, vinca-alcaloïdes (vincristine, vinblastine ou médicaments similaires contre le cancer),

- halofantrine (contre la malaria), statines (atorvastatine, simvastatine e pour réduire le taux de cholestérol), et fluvastatine ou médicaments similaires
- méthadone (contre la douleur), célécoxib, flurbiprofène, naproxène, ibuprofène, lornoxicam, méloxicam, diclofénac (anti-inflammatoires non stéroïdiens),
- prednisone
- zidovudine (aussi appelée « AZT »), saquinavir, médicaments contre le diabète tels que chlorpropamide, glibenclamide,
- glipizide ou tolbutamide, théophylline (contre l'asthme), tofacitinib, vitamine A (complément nutritionnel).

- vitalimie A (compenient indutionile).

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament, y compris ceux disponibles sans ordonnance. Interactions de Fluconazole Pfizer® avec les aliments et les boissons

interactions de riuconazole Prizer avec les alliments et les boissons Fluconazole Prizer peut être pris pendant ou en dehors des repas. Grossesse et allaitement Informez votre médecin en cas de grossesse, de prévision de grossesse ou d'allaitement. En cas de grossesse ou d'allaitement, vous ne devez prendre Fluconazole Prizer que sur prescription de votre médecin. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre

tout médicament

Conduite de véhicules et utilisation de machines Lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines, il convient de

tenir compte des risques éventuels d'étourdissement ou d'épilepsie

tenir compte des risques eventueis d'étourdissement ou d'épilepsie. Liste des excipients à effet notoire Ce médicament contient une faible quantité (49,708 mg/ gélule) de lactose (sucre de lait). Si votre médecin a diagnostiqué chez vous une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE FLUCONAZOLE PFIZER®?

Veillez à toujours prendre votre médicament en suivant exactement les **indications de votre médecin.** En cas de doute, vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

Avalez chaque gélule en entier avec un verre d'eau. Il est recommandé de prendre les gélules à la même heure chaque jour. Les doses habituelles de ce médicament pour traiter différents types d'infections

sont indiquées ci-dessous :

Posologie

Adultes

Traitement des candidoses Dose unique de 150 mg Traitement des candidoses |
Dose unique de 150 mg
vaginales |
Réduction de la récurrence | 150 mg une fois par mois pendant 4 à 12 mois en
des candidoses vaginales |
cas de risque d'inflection |
Traitement des infections |
Traitement des infections |
Traitement des de la peau et mg, pendant 2 4 semaines (jourgu'à 6 semaines pour le pied d'athlète; pour le traitement des infections de l'ongle, jusqu'à ce que l'ongle infecté soit remplacé)

es prescrites par votre médecin peuvent être différentes de celles figurant dans cette notice. Veillez à toujours prendre votre médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. En cas de doute, vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

Personnes âgées

Sauf en cas de problèmes rénaux, la dose habituelle pour l'adulte doit Patients souffrant de problèmes rénaux
Votre médecin peut modifier la posologie pour l'adapter aux spécificités de

votre fonction rénale

Si vous avez pris plus de Fluconazole Pfizer® que vous n'auriez dû

Si vous prenez trop de gélules à la fois, vous risquez de vous sentir mal.

Contactez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. En cas de surdosage, les symptômes possibles sont les hallucinations auditives, visuelles et sensorielles (comportement paranoïde). Un traitement symptomatique (avec mesures d'accompagnement et lavage gastrique si nécessaire) peut s'avérer utile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, Fluconazole Pfizer® est susceptible d'avoir des effets indésirables qui n'affectent pas tous les utilisateurs. Si l'un de ces symptôme survient, arrêtez de prendre Fluconazole Pfizer® et

pariez-en immédiatement à votre médecin. Les effets indésirables fréquents qui affectent 1 à 10 personnes sur 100 sont

- indiqués ci-dessous
- gêne abdominale, diarrhées, sensation de malaise, vomissements, modification des résultats des tests sanguins pour la fonction hépatique,

Les effets indésirables peu fréquents qui affectent 1 à 10 personnes sur 1000

- insomnie, somnolence, épilepsie, évanouissements, étourdissements, sensation de tournoiement, fourmillements, picotements ou engourdissements, altération du goût,
- digestion difficile, flatulences, sécheresse buccale,
- douleurs musculaires
- papules, cloques (urticaire), démangeaisons, sudation accrue
- papules, includes (unicately, lorentangeaisors, soudant accuracy, atteinte du foie et jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse), fatigue, sensation générale de malaise, fièvre, essoufflement.

 Les effets indésirables rares qui affectent 1 à 10 personnes sur 10000 sont
- indiqués ci-dessous baisse des globules rouges qui peut rendre la peau plus pâle et provoquer
- baisse des globules rouges qui peut rendre la peau plus pale et provoquer faiblesse ou essoufflement, taux anormalement bas de globules blancs (qui participent à la défense contre les infections) et d'hématocytes (qui aident à arrêter les hémorragies), décoloration rouge ou violacée de la peau, qui peut être due à une faible numération plaquettaire ou à d'autres modifications des hématocytes,

- modification de la chimie du sang (taux élevé de cholestérol, de graisse), faible taux de potassium dans le sang,
- tremblements.
- trembiements, delectrocardiogramme (ECG) anormal, modification du rythme cardiaque, atteinte du foie, notamment l'insuffisance hépatique, réactions allergiques (parfois graves), notamment rash avec cloques nombreuses et desquamation, réactions cutanées graves, gorflement
- des lèvres ou du visage, chute des cheveux,
- Angio-ædème. Syndrome de Stevens-Johnson.

Si l'un des effets indésirables s'aggrave ou si vous observez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER FLUCONAZOLE PFIZER®?

- Tenez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

 N'utilisez pas Fluconazole Pfizer® après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au demier jour du mois. A conserver à une température comprise entre 15 et 25 °C.

 Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les
- ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures permettront de protéger l'environne 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Composants de Fluconazole Pfizer® - La substance active est le fluconazole. - Chaque gélule contient 50 mg de fluconazole. - Autres composants :

Contenu des gélules : lactose monohydraté, amidon de maïs, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, laurylsulphate de sodium. Composition de l'enveloppe des gélules :

Gélules de 50 mg : gélatine, de dioxide de titane (E171), de Bleu V Patenté (E131) et d'oxyde de fer noir (E172). Présentation de Fluconazole Pfizer® en gélules de 50 mg et contenu

de l'emballage extérieur
Fluconazole Pfizer® en gélules de 50 mg est conditionné en plaquette de

CONDITIONS DE DELIVRANCE

LISTE 1.

SA DELIVRANCE NE PEUT ETRE RENOUVELEE QUE SI LE MEDECIN L'A EXPRESSEMENT INDIQUE SUR L'ORDONNANCE OU SUR PRESENTATION D'UNE NOUVELLE ORDONNANCE.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE:

- Il ne peut pas etre adapte a un autre cas.
 Il ne peut pas etre reutilise sans avis medical.

Il ne peut pas etre conseille a une autre personne.

VOTRE MEDECIN ET VOTRE PHARMACIEN CONNAISSENT BIEN LES
MEDICAMENTS, N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE JAMAIS LAISSER UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

DETENTEUR DE LA DÉCISION D'ENREGISTREMENT :

Pfizer Pharm Algérie

Algeria Business Center Les Pins Maritimes. El Mohammadia. Alger - Algérie FABRIQUE ET CONDITIONNE PAR :

fizer Saidal Manufactu

Z.I. de Oued S'mar Dar El Baida, Alger - Algérie.

Date de révision de la notice : Décembre 2013. Marque déposée