

# Nifuroxazide 4%®

## Suspension buvable

### Forme et présentation

Suspension buvable 4 %; flacon de 90 ml (18 cuillères – mesure de 5 ml)

### Composition:

Nifuroxazide.....	4,0 g
Saccharose.....	20,0 g
Parahydroxybenzoate de méthyle.....	0,1 g
Excipient aromatisé à la banane q.s.p.....	100 g

1 Cuillère (5 ml) = 0,218 g de nifuroxazide et de saccharose.

### Propriétés:

Antibactérien intestinal dont l'activité est essentiellement de contact intraluminal

### Indication:

Diarrhée aiguë présumée d'origine bactérienne en l'absence de suspicion de phénomènes invasifs (altération de l'état général, fièvre, signe toxi-infectieux...)

Le traitement ne dispense pas d'une réhydratation si elle est nécessaire, l'importance de la réhydratation et sa voie d'administration doivent être adaptées à l'importance de la diarrhée, à l'âge et à l'état du patient.

### Posologie et mode d'administration:

**Nourrisson:** ( de 1 à 30 mois): 1 à 3 cuillères (5 ml) par jour selon l'âge, en 2 à 3 prises

**Enfant:** 03 cuillères (5 ml) par jour en 3 prises

Le traitement ne doit pas dépasser 7 jours.

**Dans tout les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin**

### Voie orale

Agiter le flacon avant l'emploi

Les doses doivent être fractionnées en plusieurs prises, en fonction de la rapidité du transit.

**Contre-indications:** antécédent de réaction allergique aux dérivés de nitrofurane

Prématuré et nouveau né (0 à 1 mois)

### Mises en garde:

En cas de fièvre, diarrhée abondantes, de présence de sang ou de glaires dans les selles, de vomissement ou d'autres signes digestifs associés, avertir votre médecin

Chez le nourrisson (moins de 2 ans); consulter votre médecin, en attendant la consultation; arrêter l'alimentation lactée, donner des boissons sucrées (jus de fruit) et salés (bouillons salés). La quantité doit être suffisante pour compenser les pertes en liquide dues à la diarrhée. Surveiller le poids toutes les 6 heures.

L'enfant doit rester vif et tonique, l'inverse signifierait une déshydratation et une hospitalisation d'urgence serait indispensable.

### Précaution d'emploi:

Ne pas utiliser dans le cas d'un déficit congénital en saccharose

Chez l'enfant de plus de 2 ans: ce traitement ne dispense pas de réhydratation: boisson sucrée, bouillon salé

Arrêt du lait et laitage le premier jour

Si la diarrhée persiste au-delà de 2 jours, consulter votre médecin

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

### Effets indésirables:

Possibilité de réactions allergiques.

### Interactions médicamenteuses:

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**Décision d'enregistrement n°:** 02/10 C 018/088

Fabriqué par:

**Laboratoires Pharmaghreb**

14125 Mellakou Tiaret.

Tél.: 046420240.

Fax: 046420205.

 **LABORATOIRES  
PHARMAGHREB**  
Le capital santé