

HISTONE®

Antiallergique

Dans quel cas le médicament HISTONE® est-il prescrit ?

Ce médicament est un antihistaminique antiallergique. Il a en outre des effets sédatifs et atropiniques.

Il est utilisé dans le traitement des manifestations allergiques diverses : rhinite ou conjonctivite allergiques, urticaire.

Présentations du médicament HISTONE®

HISTONE® : sirop; flacon de 100ml

Composition du médicament HISTONE®

	p 1 ml
Dexchlorphéniramine maléate	0,1 mg

Contre-indications du médicament HISTONE®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- risque de glaucome à angle fermé,
- risque de blocage des urines (adénome de la prostate),
- enfant de moins de 6 ans (comprimé).
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire.

Du fait de la présence d'un antihistaminique ayant des propriétés sédatives et atropiniques, des précautions sont nécessaires chez l'insuffisant hépatique ou rénal et chez la personne âgée, notamment en cas de constipation chronique, d'adénome de la prostate, de tendance aux vertiges ou aux baisses de tension.

Le sirop contient du sucre (saccharose) en quantité notable.

Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.



Ce médicament peut induire une somnolence parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite ou l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées.

Interactions du médicament HISTONE® avec d'autres substances

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament ayant des effets atropiniques ou sédatifs (tranquillisants, somnifères, certains médicaments contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs, neuroleptiques...).

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas.

En cas de prise en fin de grossesse, une surveillance du nouveau-né peut être nécessaire.

Allaitement :

Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : par mesure de prudence, il est déconseillé pendant l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament HISTONE®

Pour une action régulière du médicament, répartir les prises dans la journée. En cas de somnolence gênante, ne prendre le médicament que le soir.

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Posologie usuelle :

Sirop :

- Adulte : 4 cuillères-mesure de 5 ml, 3 ou 4 fois par jour.
- Enfant de 10 à 15 ans : 2 cuillères-mesure de 5 ml, 2 ou 3 fois par jour.
- Enfant de 30 mois à 10 ans : 1 cuillère-mesure de 5 ml, 2 ou 3 fois par jour.
- Nourrisson : 1 cuillère-mesure de 2,5 ml, 2 ou 3 fois par jour.

Conseils

Ce médicament agit sur les manifestations de l'allergie mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

Effets indésirables possibles du médicament HISTONE®

Somnolence.

Effets atropiniques : sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, blocage des urines, constipation, palpitations.

Hypotension orthostatique, vertiges, tremblements, agitation.

Réaction allergique.

Anomalie de la numération formule sanguine.