

CLARADINE®

(LORATADINE à 5mg/5ml. DCI)

Solution buvable : Flacon de 60 ml

Antihistaminique à structure tricyclique
60 ml
Solution buvable

N° Enreg : 07 / 01A034 / 073



Forme et présentation :

Solution buvable. Flacon de 60 ml.
5 ml de solution buvable = 5 mg de principe actif.

Composition :

Loratadine (DCI)100 ml
Propylène glycol, Glycérol, Benzoate de sodium, Acide citrique, Arôme banane,
Saccharose, eau, Q.S.P.....100 mg

Propriété :

La Loratadine est un antihistaminique à structure tricyclique agissant sélectivement sur les récepteurs H1 périphériques. Au cours d'études de son action sur le système nerveux central, la Loratadine n'a fait preuve d'aucune activité dépressive ou anticholinergique aiguë.

La Loratadine pénètre facilement le système nerveux central mais a montré une faible affinité pour les récepteurs membranaires cérébraux.

Au cours du traitement à long terme, on n'a observé aucune modification cliniquement significative des signes vitaux, des valeurs de laboratoires, des résultats des examens physiques et des ECG.

La Loratadine n'a pas d'action significative au niveau des zones de fixation des récepteurs H2, n'inhibe pas la captation de la noradrénaline et n'a pas d'influence sur la fonction cardiovasculaire ou sur l'activité pacemaker intrinsèque du cœur.

Indications :

Traitement des symptômes associés à la rhinite allergique tels qu'éternuements, écoulement nasal, picotement nasal, sensation de brûlure et picotement oculaire. Traitement symptomatique des urticaires aigus de l'enfant, ainsi que les allergies cutanées.

Précautions d'emploi :

L'innocuité et l'efficacité de LORATADINE n'ont pas été démontrées chez les enfants de moins de 2 ans.

Chez les diabétiques, tenir compte de la quantité de saccharose par unité de prise : 3 gr par cuillère à café ou gobelet doseur de 5 ml.

Effets indésirables :

LORATADINE n'a pas de propriétés sédatives ni anticholinergiques cliniquement significatives à la dose journalière recommandée.

Des effets indésirables ont été mentionnés : fatigue, céphalées, troubles gastro-intestinaux tels que nausées, augmentation de l'appétit, ainsi que des symptômes allergiques tels que le rash.

N° d'enregistrement : 07 / 01A034 / 073.

