INPHA-MédiS
Industrie Pharmaceutique

CLARDINE

- Loratadine 0,1% -

COMPOSITION :

Loratadine (DCI) .....100 mg.
EXCIPIENTS : acide citrique anhydre, glycérol, propylèneglycol, saccharose, benzoate de sodium, arome artificiel de peche, eau purifiée q.s.p .....100 ml.

FORME et PRESENTATIONS:

Solution buvable. Flacon de 60 ml avec cuillère-mesure de 5 ml.

CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE :

Antihistaminique par voie systémique (R:système respiratoire).

INDICATIONS :

- Traitement des symptômes associés à la rhinite allergique tels qu'éternuements, écoulement nasal, picotement nasal, sensation de brûlure et picotement oculaire.
- Traitement symptomatique des urticaires aigues de l'enfant.

POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION :

Enfant de 2 à 12 ans :
- poids corporel > 30 kg : 10 mg de Clardine, une fois par jour (2 cuillères - mesure de sirop);
- poids corporel 30kg : 5 mg de Clardine, une fois par jour (1 cuillère-mesure de sirop).

Vu l'absensce de données suffisantes, la prudence est requise chez les patients atteints d'insuffisance hépatique très sévère.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité ou idiosyncrasie à l'un des composants du médicament.
- Enfant de moins de 2 ans.

MISES EN GARDE et PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'innocuité et l'efficacité de clardine n'ont par été démontrées chez les enfants de moins de 2 ans.

INTERACTIONS :

Interactions médicamenteuses :
Des études des performances psychomotrices ont démontré que l'administration simultanée d'alcool ne potentialise pas les effets de Clardine.
Comme pour tout nouveau médicament, la prudence est de mise lors de l'administration de Clardine avec d'autres médicaments.
La prise simultanée de Clardine et d'aliments peut légèrement ralentir l'absorption (±1 heure) sans pour autant influencer l'effet clinique.
En l'absence de données suffisantes, la prudence est conseillée en cas d'association avec la cimétidine.

GROSSESSE et ALLAITEMENT :

Grossesse:
Les données existantes sont insuffisantes pour en apprécier la nocivité éventuelle. Les effets tératogènes chez l'animal n'ont pas été établis.

Allaitement :
La loratadine est excrétée dans le lait maternel.

EFFETS INDESIRABLES :

Clardine n'a pas de propriétés sédatives ni anticholinergique cliniquement significatives à la dose journalière recommandée.
Des effets indésirables ont été rapportés : fatigue, céphalées, troubles gastro-intestinaux tels que nausées, augmentation de l'appétit, gastrite, ainsi que des symptômes allergiques tels que le rash.

SURDOSAGE :

A des dosse plusieurs fois supérieures à la dose recommandée (40 mg ou plus), on a observé une augmentation de la sédation. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun surdosage aigu avec la loratadine. Une prise unique de 160 mg n'a occasionné aucun effet indésirable significatif. Si nécessaire, le traitement d'un surdosage sera surtout symptomatique. Le vomissement sera induit même s'il s'est déjà produit spontanément. Le sirop d'ipéca peut être utilisé à cette fin. Cependant, le vomissement ne sera pas induit chez le patient inconscient.
Des précautions contre l'inhalation par fausse-route seront prises, principalement chez l'enfant. Après vomissement, le médicament restant dans l'estomac peut être absorbé par administration de charbon de bois en suspension dans l'eau.
Si le vomissement est insuffisant ou contre-indiqué, on procédera à un lavage d'estomac avec du sérum physiologique et ce, en particulier chez l'enfant. Chez l'adulte, on peut utiliser de l'eau courante. Cependant, la plus grande quantité possible de liquide administré sera enlevée avent l'instillation suivent.
Des solution salines purgatives provoquent, par osmose, un afflux d'eau dans l'intestin et peuvent par conséquent être indiquées pour une dilution rapide du contenu de l'intestin.
Il n'est pas établi que la loratadine soit dialysable.
Après le traitement d'urgence, le patient restera sous survillance médicle.

PRÉSENTATION ET N° DE:

Spécialité	Présentation	N° D.E.
Clardine	Flacon de 60 ml	DE: 07 / 01A 034 / 317

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E
Les laboratoires INPHA-Médis
Siège sociale : 08,Rue Prosper Dubourg,Annaba-Algérie
Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44,Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.