

RHITENE 10 mg/ml

Cétirizine

Solution buvable en gouttes



COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Dichlorhydrate de Cétirizine1,00 g
Excipients : Q.s.p. 100 ml

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable en gouttes.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTI-HISTAMINIQUE A USAGE SYSTEMIQUE
(R : SYSTEME RESPIRATOIRE ; D : DERMATOLOGIE)

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un antihistaminique. (Il s'oppose aux effets de l'histamine, substance libérée dans l'organisme au cours de l'allergie)
Il est indiqué Chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans pour le traitement des symptômes :

- nasaux et oculaires des rhinites allergiques saisonnières et perannuelles.
- de l'urticaire chronique idiopathique.

ATTENTION ! DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des constituants,
- Insuffisance rénale,
- Enfant de moins de 2 ans

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments,

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU AU VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement .

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament .

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN .

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS .

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

20 gouttes = 10 mg = 1 ml ; le flacon contient 300 gouttes. A diluer dans un peu d'eau, de lait ou de jus de fruit.

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans : 20 gouttes (10 mg) une fois par jour.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans : 20 gouttes (10 mg) une fois par jour ou 10 gouttes (5 mg) 2 fois par jour.

Chez l'enfant de 2 à 6 ans : 10 gouttes (5 mg) une fois par jour ou 5 gouttes (2,5 mg) 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN .

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale .

DUREE DU TRAITEMENT : Se conformer à l'ordonnance de votre médecin .

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE : Consulter un médecin .

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Possibilité de troubles digestifs, bouche sèche, vertige

Exceptionnellement, ont été décrits des cas de réactions allergiques à type de réactions cutanées et œdèmes de Quincke.

Chez l'enfant, possibilité de somnolence.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN .

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR .

Fabriqué par : LABORATOIRE BIOALENIC

Zone Industrielle ZighouYoucef 25200 Constantine Algérie