

## 1. QU'EST-CE QUE DESLOR ?

### Forme pharmaceutique

DESLOR se présente sous forme de sirop.

### Classe pharmacothérapeutique

Antihistaminique H1 (Desloratadine)

### Composition

Chaque 100 ml contient :

Desloratadine..... 0,50 mg

Excipients : Propylène glycol ; Acide citrique anhydre ; Citrate de sodium tribasique ; Benzoate de sodium ; Edétate disodique ; Saccharose ; Sorbitol 70% ; Jaune orange E110 ; Arôme bubble gum artificiel ; Eau purifiée ..... Q.S.P

## 2. DANS QUELS CAS UTILISER DESLOR ?

DESLOR est indiqué pour le traitement symptomatique de :

- la rhinite allergique.

- l'urticaire.

## 3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE ?

### Contre indications

- Hypersensibilité à la desloratadine, à l'un de ces excipients ou à la loratadine.

### Mise en garde et précautions d'emploi

DESLOR doit être utilisé avec précaution en cas d'insuffisance rénale sévère.

- Ce médicament contient du saccharose et du sorbitol ; par conséquent, il ne doit pas être administré chez les rares patients atteints d'intolérance au fructose, en cas de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

- Ce médicament contient l'agent colorant E110 qui peut provoquer des réactions allergiques.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

#### Grossesse

la desloratadine n'a pas montré d'effet tératogène lors des études effectuées chez l'animal. La sécurité du produit pendant la grossesse n'a pas été établie.

En conséquence, l'utilisation de DESLOR pendant la grossesse n'est pas recommandée.

#### Allaitement

la desloratadine est excrétée dans le lait maternel, par conséquent l'utilisation de DESLOR n'est pas recommandée chez la femme qui allaite.

## 4. COMMENT PRENDRE DESLOR ?

### Posologie et mode d'administration

#### Posologie

DESLOR peut être pris aussi bien au moment qu'en dehors des repas pour le soulagement des symptômes associés à la rhinite allergique (incluant les rhinites allergiques intermittente et persistante) et à l'urticaire.

- Le prescripteur devra garder en mémoire le fait que chez l'enfant de moins de 2 ans, la majorité des cas de rhinites est d'origine infectieuse et qu'il n'y a pas de données validant l'efficacité de DESLOR en traitement de la rhinite infectieuse.

- Enfants de 1 à 5 ans : 2,5 ml (1,25 mg) de DESLOR sirop une fois par jour.

- Enfants de 6 à 11 ans : 5 ml (2,5 mg) de DESLOR sirop une fois par jour.

- Adultes et adolescents (12 ans et plus) : 10 ml (5 mg) de DESLOR sirop une fois par jour.

- La rhinite allergique intermittente doit être prise en charge en fonction de l'évaluation des antécédents de la maladie du patient, le traitement pouvant être interrompu après disparition des symptômes, et rétabli à leur réapparition.

Dans la rhinite allergique persistante, un traitement continu peut être proposé aux patients pendant les périodes d'exposition allergénique.

## 5. SURDOSAGE ?

En cas de surdosage, l'élimination par les méthodes usuelles de la substance active non absorbée devra être envisagée.

Un traitement symptomatique et des mesures thérapeutiques adaptées sont recommandés.

La desloratadine n'est pas éliminée par hémodialyse ; on ne sait pas si elle est éliminée par dialyse péritonéale.

## 6. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Chez les enfants de 2 à 11 ans : diarrhée, fièvre et insomnie, alors que chez l'adulte : fatigue, sécheresse de la bouche et mal de tête.

## 7. COMMENT CONSERVER DESLOR ?

A conserver à une température inférieure à 25°C

## 8. QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DELIVRANCE ?

Ce médicament est inscrit sur la liste II

Sous ordonnance médicale

## 9. PRESENTATION ET NUMERO D'AMM

Spécialité	Présentation	N° d'AMM
DESLOR	Flacon de 150 ml	11/01 A048/317.

DATE DE LA DERNIERE REVISION : 09/2010

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non-conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit, suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Gardez les médicaments hors de la portée des enfants

Fabricant et Titulaire de la D.E

Les laboratoires INPHA-Médis

Siège social : 08, Rue Prosper Dubourg, Annaba-Algérie

Usine : Sidi Kaci, Route nationale 44, Ben M'Hidi El Tarf-Algérie.

INPHA-Médis  
Industrie Pharmaceutique