


BILAXTEN®Bilastine
Comprimés
par voie orale**COMPOSITION**Bilastine^{pCp}20mg

Excipients : Cellulose Microcristalline, Glycolate d'amidon sodique

Silice colloïdale anhydre et Stéarate de magnésium.

Bilaxten 20 mg comprimés ,boîte de 10 et boîte de 20.

N° de la DE: 12/01A049/001

INDICATIONS

Les comprimés de Bilaxten contiennent de la Bilastine qui est un antihistaminique.

Bilaxten 20 mg comprimé est indiqué pour soulager les symptômes du rhume des foies (Éternement, picotements, écoulement nasal et congestion nasale, yeux rouges et larmolement) et autres problèmes allergiques similaires. Il peut aussi être utilisé pour traiter les éruptions cutanées accompagnées de démangeaison (urticaire).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Adultes, y compris les personnes âgées et les adolescents de 12 ans et plus :

- Prendre un comprimé par jour.
- Le comprimé doit être pris l'estomac vide, (le matin avant le petit déjeuner). Après avoir pris un comprimé de bilaxten, attendre une heure avant de prendre des aliments.
- Avaler le comprimé avec un peu d'eau.
- La barre de cassure n'est pas destinée à diviser le comprimé en demi-doses égales, mais à faciliter la prise du médicament.
- Votre médecin déterminera selon votre cas la durée du traitement.

Prise de Bilaxten 20 mg comprimés avec des aliments ou boissons

Il est important de ne pas prendre le médicament avec des aliments ou du jus de Pamplemousse ou d'autres jus de fruits, car cela réduirait l'effet de la bilastine. Pour éviter cela, vous pouvez :

- prendre le comprimé et attendre une heure avant d'absorber un aliment ou du jus de fruit, ou bien si vous avez absorbé un aliment ou du jus de fruit, attendre deux heures avant de prendre le comprimé.

Prise d'alcool

- La bilastine, à la posologie recommandée (20 mg), n'augmente pas l'effet produit par l'alcool.

En cas d'oubli de prendre Bilaxten 20 mg, comprimés :

- Si vous oubliez de prendre votre dose au moment voulu, prenez-la dès que possible et prenez la dose suivante au moment habituel.
- Ne prenez pas une double dose pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne prenez pas les comprimés de Bilaxten 20 mg si vous êtes allergiques (hypersensibles) à la bilastine ou à tout autre composant de ce médicament.

Faites particulièrement attention avec Bilaxten 20 mg si vous souffrez d'une insuffisance rénale modérée à sévère ou si vous prenez d'autres médicaments.

Respectez la dose recommandée. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

CONTRE INDICATIONSCe médicament est contre-indiqué chez les enfants de moins de 12 ans.
hypersensibilité à la bilastine ou à l'un des excipients.**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Demandez en particulier l'avis de votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole (un médicament antifongique)
- Erythromycine (un antibiotique)
- Diltiazem (pour traiter l'angine de poitrine)
- Cyclosporine (pour réduire les défenses de l'organisme en cas de

transplantations ou de maladies comme le psoriasis, la dermatite atypique ou la polyarthrite)

- Ritonavir (pour traiter le sida)
- Rifampicine (un antibiotique)

Grossesse et Allaitement

Contactez votre médecin si vous êtes enceinte, désirez l'être ou si vous allaitez.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une étude réalisée pour établir les effets de la bilastine sur l'aptitude à conduire a montré qu'un traitement de 20 mg de bilastine n'a pas d'effet sur la conduite. Néanmoins, certaines personnes peuvent souffrir de somnolence, ce qui peut affecter leur capacité à conduire ou utiliser des machines.

EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, Bilaxten 20 mg comprimés peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne se manifestent pas chez toutes les personnes.

Les effets indésirables suivants ont été observés:

Fréquent: survient chez 1 à 10 patients sur 100

- maux de tête
- somnolence

Peu fréquent: survient chez 1 à 10 patients sur 1000

- douleurs abdominales
- augmentation du taux de créatinine dans le sang
- augmentation du taux des triglycérides dans le sang
- prise de poids
- tests sanguins indiquant des changements de la fonction hépatique
- tracé anormal du rythme cardiaque (ECG)
- battements de cœur irréguliers
- étourdissement
- acouphène (sifflement d'oreilles)
- vertiges (sensation vertigineuse ou d'étourdissement)
- nez sec
- douleurs de l'estomac
- nausées (sentiment d'être malade)
- diarrhée
- bouche sèche
- indigestion
- gastrite (inflammation de la paroi de l'estomac)
- démangeaisons

- augmentation de l'appétit
- boutons de fièvre (herpes oral)
- fatigue
- soif
- fièvre
- sentiment de faiblesse
- anxiété
- troubles du sommeil
- difficulté à respirer

Si l'un des effets mentionnés devient grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

SURDOSAGE**Symptômes :**

sensations vertigineuses, nausées, maux de tête.

En cas de prise à une posologie supérieure à 20 mg :

Contactez immédiatement votre médecin ou pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Conserver entre 15-25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

PRESCRIPTION

LISTE II

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit qui affecte la santé,son administrationsans avis médical peut être dangereuse.
- Suivre strictement la prescription médicale et les instructions du pharmacien. ses risques.
- Ne pas interrompre le traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

FAES FARMA Sous licence de:
Faes Farma, S.A., Espagne

Fabricant, Conditionneur et Détenteur de la DE :

HIKMA PHARMA ALGERIA

15, 16 Zone Industrielle Staoueli - ALGERIE



Révisée

12/2015

