

CLOVIR[®] comprimés 200mg

Aciclovir ANTIVIRAL

FORME ET PRÉSENTATION:

comprimés 200 mg Bte/30

COMPOSITION:

Aciclovir..... 200 mg.

EXCIPIENTS:

Glycolate d'amidon sodique, dioxyde de silicose colloïdal, stéarate de magnésium, Povidone K-25, microcristalline cellulosose (Avicel PH 101).

PROPRIÉTÉS:

- CLOVIR (Aciclovir) est un antiviral très actif in vitro contre le virus herpès simplex type I et II et le virus Herpes Zoster.
- CLOVIR (Aciclovir) a une très faible toxicité pour les cellules hôtes des mammifères.
- Pour être actif, l'aciclovir doit être phosphorylé en aciclovir triphosphate. Seules les cellules infectées par le virus herpétique en phase de multiplication peuvent réaliser cette phosphorylation grâce à une enzyme virale (la thymidine kinase).

L'aciclovir triphosphate inhibe sélectivement l'ADN polymérase viral la succession de ces deux étapes sélectives permet d'inhiber la multiplication virale sans interférer avec le métabolisme cellulaire normal.

PHARMACOCINÉTIQUES:

CLOVIR (Aciclovir) est partiellement absorbé par l'intestin. La demi-vie plasmatique est d'environ 2,9 heures. L'aciclovir résorbé est principalement éliminé par voie rénale et sous forme inchangée; l'élimination par le rein d'aciclovir est considérablement plus importante que celle de la créatinine. La principale métabolite d'aciclovir est le 9-carboxyméthoxyméthylguanine qui représente 10 à 15% de la quantité totale du produit retrouvé dans l'urine.

Chez les patients ayant une insuffisance rénale chronique la demi-vie est plus longue; elle est en moyenne de 19,5 heures. La concentration plasmatique d'aciclovir diminue de 60% à peu près pendant la dialyse. La demi-vie pendant l'hémodialyse est de 5,7 heures chez les personnes âgées, il y a un léger changement dans le demi-vie terminale.

INDICATIONS:

Le CLOVIR comprimé est indiqué dans le traitement des infections à virus herpès simplex, infections virales cutanées et de la membrane muqueuse, incluant les primo-infections génitales à virus herpès simplex et des récurrences ultérieures. Prévention des infections à virus herpès simplex chez les sujets immunodéprimés et leurs récurrence. Le CLOVIR comprimé est aussi indiqué dans le traitement des infections aiguës de l'Herpes Zoster.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Mode d'administration: voie orale

Clovir peut être dissous dans un minimum de 50 ml d'eau ou avalé avec un peu d'eau.

Posologie:

Traitement de l'herpès simplex chez l'adulte:

200mg de clovir 5 fois par jour à environ 4 heures d'intervalles, le traitement doit être poursuivi pendant 5 jours.

Chez les patients immunodéprimés ou présentant une altération de l'absorption intestinale, la dose peut être doublée à 400 mg ou envisager un traitement alternativement par voie intraveineuse.

Suppression des infections à herpès simplex chez les patients immunocompétents:

200mg de clovir doit être pris 4 fois par jour à intervalles d'environ 6 heures ou 400 mg de clovir 2 fois par jour à des intervalles d'environ 12 heures.

certain patients peuvent présenter des infections nécessitant des doses quotidiennes totales de 800 mg de clovir.

Le traitement doit être interrompu périodiquement pendant 6 à 12 mois, afin d'observer d'éventuels améliorations de la maladie.

Prophylaxie des infections herpétiques simplex chez les patients immunodéprimés : la posologie est de 200 mg 4 fois par jour à des intervalles d'environ 6 heures.

Traitement d'herpès zoster chez l'adulte et de la varicelle:

800 mg de clovir doit être prise 5 fois par jour à des intervalles d'environ 4 heures.

le traitement doit être poursuivi pendant 7 jours.

Chez les patients gravement immunodéprimés ou présentant une altération de l'absorption intestinale, il faut utiliser la forme intraveineuse.

L'administration doit débuter le plutôt possible: le traitement de l'herpès Zoster donne de meilleurs résultats si il est administré dès le début de l'éruption.

Le traitement de la varicelle chez les patients immunocompétents devrait commencer dans les 24 heures après le début de l'éruption. Traitement de la varicelle : 6 ans et plus : 800 mg de clovir 4 fois par jour .

2-5 ans : 400 mg de clovir 4 fois par jour .

Moins de 2 ans : 200 mg de clovir 4 fois par jour .

Le traitement doit être poursuivi pendant 5 jours

CONTRE-INDICATIONS:

Antécédents d'hypersensibilité à l'Aciclovir ou à l'un des excipients .

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Pendant la grossesse, l'aciclovir est conseillé, seulement, si les bienfaits l'emportent sur les risques inconnus. Des études ont prouvé le passage de l'aciclovir dans le lait maternel.

EFFETS INDÉSIRABLES:

Quelques éruptions cutanées bénignes regressant à l'arrêt du traitement ont été décrites:

- Les manifestations suivantes ont été parfois rapportées: Troubles digestifs, augmentation de la concentration plasmatique de la bilirubine ou des transaminases discrète augmentation de l'urémie et de la créatinémie, légère diminution des indices hématologiques; troubles neurologiques réversible et fatigue, céphalées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

L'utilisation de probénécide augmente la durée de demi-vie en cas d'association avec un traitement par voie générale d'aciclovir, certains médicament qui affectent la physiologie rénale peuvent inclure sur la pharmacocinétique de l'aciclovir. L'expérience clinique n'a pas permis d'identifier d'autre médicament ayant une interaction avec l'aciclovir.

CONSERVATION:

A conserver à une température inférieure à 25°C.

PRÉSENTATIONS:

CLOVIR est disponible en 200mg, comprimés.

Ceci est un médicament

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres. Il vous concerne, vous et votre santé.
- Le médicament est un produit actif.
- Une longue recherche a permis de découvrir son activité; mais son absorption n'est pas toujours sans danger.
- Il ne faut jamais abuser des médicaments.
- Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient.
- Utilisez les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.
- Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.
- Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance, suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative.
- Votre pharmacien connaît les médicaments.
- Suivez ses conseils.

Ne pas laisser à la portée des enfants

Conseil des Ministres Arabes de la Santé
Union des Pharmaciens Arabes

Liste |

Détenteur de la DE :

Société saoudienne Spimaco Algerie
Bois des cars II , Villa N°95 -Dely Ibrahim -Alger -Algérie
Fabricants et sites de Fabrication :

Fabricant du prémix :

Laboratoires Spimaco B.P 2597 , Al-Qassim , Buraydah , Arabie saoudite .

Fabricant du produit fini et conditionneur pour Spimaco Algérie :

Laboratoires Merinal : V .30 Z.I Oued Smar , Alger -Algérie.

DE : 13 /98/ 13P 097 / 190

Date de révision de la notice : Décembre 2007

" CLOVIR " est une marque déposée

34CV317

ASWNT01 (V3)