

# EXPANDOL® 100, 150, 200, 300 mg

Poudre pour solution buvable en Sachets -dose.

## COMPOSITION

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Paracétamol ..... | 100 mg |
| Paracétamol ..... | 150 mg |
| Paracétamol ..... | 200 mg |
| Paracétamol ..... | 300 mg |

EXCIPIENTS: benzoate de sodium, aspartam, saccharose, arôme orange.

## FORME PHARMACEUTIQUE

Poudre pour solution buvable en sachet-dose, boîte de 12 sachets.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE / ANTIPYRETIQUE (N : système nerveux central).

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au paracétamol ou aux autres constituants.
- Insuffisance hépatocellulaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

## MISES EN GARDE SPECIALES :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

## PRECAUTION D'EMPLOI

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans avis de votre médecin.

- En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

- En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sucre.

- En cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte dans la ration journalière de la présence de sodium.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

- Signalez que votre enfant prend ce médicament si votre médecin lui prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- Sachet à 100 mg : réservé à l'enfant de 6 à 8 kg (environ de 3 à 9 mois). 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

- Sachet à 150 mg : réservé à l'enfant de 8 à 12 kg (environ de 6 à 24 mois). 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

- Sachet à 200 mg : réservé à l'enfant de 12 à 16 kg (environ de 2 à 5 ans). 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

- Sachet à 300 mg : réservé à l'enfant de 16 à 30 kg (environ de 4 à 11 ans). 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

DANS TOUT LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE. EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

VOIE ORALE, verser le contenu du sachet, dans un verre puis ajouter une petite quantité de boisson (par ex : Eau, Lait, Jus de fruit). Remuer et boire immédiatement après.

De plus, si votre enfant présente une fièvre supérieure à 38,5°C, vous pouvez améliorer l'efficacité du traitement médicamenteux par les mesures suivantes :

- Découvrez votre enfant,

- Faites le boire,

- Ne laissez pas votre enfant dans un endroit chaud,

- Et éventuellement, baignez-le dans une eau dont la température est inférieure à 2°C à celle de l'enfant.

DANS TOUT LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

## FREQUENCE ET MOMENT AUX QUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les prises systématiques permettent d'éviter les pics de douleur ou de fièvre.

Chez l'enfant, elles doivent être régulièrement espacées, y compris la nuit, de préférence de 6 heures et d'au moins 4 heures.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

## DUREE DU TRAITEMENT

DANS TOUT LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

## CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence un médecin

## EFFETS INDESIRABLE

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée, ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Fabriqué par : Laboratoire BIO-GALENIC Zone Industrielle Zighoud Youcef Constantine 25200 ALGERIE