

# CARDAXEL PLUS 8 mg/ 12.5 mg & 16 mg/ 12.5 mg

## Candésartan cilexetil - Hydrochlorothiazide - Comprimé

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Les substances actives sont :

Candésartan cilexetil.....	8 mg
Candésartan cilexetil.....	16 mg
Hydrochlorothiazide.....	12.5mg

Excipients : QSP un comprimé.

### •QU'EST CE QUE CARDAXEL PLUS comprimés et dans quels cas est-il utilisé ?

Comprimés, Boîte 30 comprimés.

ANTAGONISTE DE RECEPTEURS A L'ANGIOTENSINE II ET DIURTIQUE

CARDAXEL PLUS est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression artérielle trop élevée sans cause évidente).

Il s'agit d'une association de deux molécules, un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et un diurétique.

Il est réservé aux patients dans la pression artérielle n'est pas contrôlée par un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II seul ou par Hydrochlorothiazide seul.

L'angiotensine II est une substance formée par l'organisme qui se lie aux récepteurs des vaisseaux sanguins, entraînant ainsi leur vasoconstriction. Il en résulte une élévation de la pression artérielle. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II empêchent la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs et provoquent ainsi un effet relaxant au niveau des vaisseaux sanguins et une baisse de la pression artérielle.

L'Hydrochlorothiazide augmente l'élimination urinaire de l'eau, du sodium et de chlorures, diminuant de cette manière la pression artérielle.

Les deux constituants du CARDAXEL PLUS 16mg/ 12.5 mg comprimés permettent ensemble de diminuer la pression artérielle de manière plus importante que si un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II ou l'Hydrochlorothiazide étaient pris seuls.

### •QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE CARDAXEL PLUS comprimés ?

Votre médecin a mesuré votre pression artérielle et a trouvé des chiffres supérieurs à la normale pour votre âge.

En l'absence de traitement, l'élévation de la pression artérielle peut léser les vaisseaux sanguins dans plusieurs organes tels que le cœur, les reins, le cerveau et les yeux.

Dans certains cas, ces lésions peuvent aboutir à des accidents coronariens, à une insuffisance cardiaque ou rénale, à un accident vasculaire cérébral ou à une perte de la vue.

Il n'existe habituellement pas de symptômes liés à l'élévation de la pression artérielle avant la survenue de ces lésions. La prise de la pression artérielle est nécessaire pour vérifier si celle-ci se situe dans la limite de la normale ou non.

Une élévation de la pression artérielle peut être traitée et contrôlée par des médicaments tels que CARDAXEL PLUS comprimé. Votre médecin peut également vous recommander de modifier votre mode de vie pour contribuer à la baisse de la pression artérielle (perte de poids, arrêt de la consommation de tabac, réduction de la consommation d'alcool, limitation de la consommation de sel).

Votre médecin peut également vous avoir incité à la pratique régulière d'effort physique légers, tels que la marche et la natation.

### •Ne prenez jamais CARDAXEL PLUS comprimés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au Candésartan, aux sulfamides ou à l'un des excipients du médicament,
- Si vous souffrez d'une maladie du foie ou d'une maladie rénale sévère,
- A partir du 2<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse,
- Au cours de l'allaitement,
- Sauf avis contraire de votre médecin, la prescription du CARDAXEL PLUS comprimé est déconseillée dans les cas suivants :
- Si vous prenez du lithium (médicament du système nerveux), certains médicaments donnant des troubles graves du rythme cardiaque, certains diurétiques hyperkaliémiants (spironolactone, amiloride, triamterène), des sels de potassium (voir rubrique Prise ou utilisation d'autres médicaments) ;
- Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de la grossesse (voir rubrique Grossesse-allaitement).

### •Prendre des précautions particulières avec CARDAXEL PLUS comprimés :

Certaines affections que vous pouvez présenter ou que vous avez pu présenter nécessitent des précautions particulières avant ou pendant la prise du CARDAXEL PLUS comprimés ; c'est pourquoi avant de prendre ce médicament, informez votre médecin des maladies que vous avez eues, en particulier : maladie des reins, problème cardiaques, diabète, goutte. Informez-le également si vous avez eu récemment des vomissements ou des diarrhées en grande quantité, si vous suivez un régime sans sel.

Un bilan biologique (avec surveillance du taux de potassium dans le sang) sera régulièrement effectué sous traitement.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladie métabolique rares).

Si vous allez être opéré, informez votre médecin ou votre dentiste que vous prenez CARDAXEL PLUS comprimés. CARDAXEL PLUS associé à certains médicaments anesthésiques, peut provoquer une baisse de votre pression artérielle.

### •Grossesse – Allaitement

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament.

En effet, ce médicament est déconseillé au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de la grossesse et il est contre-indiqué durant les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestres de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'utilisation du CARDAXEL PLUS est contre indiquée au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### •Sportifs

Le diurétique contenu dans ce médicament peut induire une réaction positive des tests pratiques lors du contrôle antidopage.

### •Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines, la survenue possible de vertiges ou de fatigue au cours du traitement doit être prise en compte.

### •Liste des excipients à effets notoire : lactose monohydraté

### •Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, notamment si vous prenez certains types diurétiques (spironolactone, amiloride, triamterène seul ou associés), des sels de potassium, du lithium (médicament du système nerveux), des médicaments susceptibles d'induire des troubles graves du rythme cardiaque (astémizole, bépridil, diphémanil ; érythromycine et vincamine), même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### •COMMENT PRENDRE CARDAXEL PLUS comprimés ?

Prenez CARDAXEL PLUS chaque jour en respectant strictement la prescription de votre médecin.

La dose habituelle du CARDAXEL PLUS est d'un comprimé par jour, en une seule prise.

Si vous avez l'impression que l'effet du CARDAXEL PLUS comprimés est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

CARDAXEL PLUS peut être avalé avec un peu d'eau pendant ou entre les repas.

CARDAXEL PLUS doit être pris tout les jours.

Essayer de prendre CARDAXEL PLUS chaque jour au même moment pour éviter tout oubli.

L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui nécessite un traitement prolongé. Il est donc particulièrement important que vous preniez ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous la demande.

### Si vous avez pris plus du CARDAXEL PLUS comprimés que vous n'auriez dû :

Si vous avez dépassé la dose prescrite, prévenez immédiatement votre médecin, afin qu'il vous donne son avis rapidement.

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

### Si vous oubliez de prendre CARDAXEL PLUS comprimés :

Prenez CARDAXEL PLUS chaque jour comme cela vous a été prescrit. Toutefois, si vous avez oublié de prendre ce médicament, ne prenez pas un comprimé en plus mais poursuivez votre traitement normalement.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par CARDAXEL PLUS, comprimés est arrêté : Sans objet.

### •QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tout les médicaments, CARDAXEL PLUS comprimés est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Ont été rapportés : vertige, céphalées (maux de tête), nausées, hépatites, angio-œdème (gonflement de la face, des lèvres, de la langue et/ou du larynx entraînant une difficulté à respirer ou à avaler, gonflement des mains et des pieds), démangeaisons importantes de la peau, réactions cutanées anormales, douleurs dorsales, arthralgies (douleur des articulations), myalgies (douleurs musculaires), altération de la fonction rénale pouvant aller jusqu'à l'insuffisance rénale chez des patients à risque, sensations de picotement, vision floue, constipation, fatigue, affection du pancréas, modification du bilan biologique : modification des taux sanguins de potassium, de sodium et des cellules sanguines (globules rouge et blancs), augmentation de la créatinine dans le sang, augmentation de certains enzymes du foie, augmentation du taux de lipides. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### •COMMENT CONSERVER CARDAXEL PLUS?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

Fabriqué par :

Laboratoire BIOGALENIC

Zone Industrielle Zighoud Youcef

Constantine 25200 ALGERIE