

***Nifuroxazide physiopharm®***

*Nifuroxazide*

*Suspension Buvable*

4 %

**Qu'est-ce que nifuroxazide physiopharm  
4 % suspension buvable ?**

Nifuroxazide ..... 4,000 g

Pour 100 g de suspension buvable.

Saccharose , carbomère 971P NF , arôme naturel banane E9815991 , acide citrique anhydre, hydroxyde de sodium, alcool éthylique à 95°, parahydroxybenzoate de méthyle, eau purifiée.

*Excipients à effet notoire :*

*Saccharose 20gr/100ml*

*Alcool 0.885gr/100ml*

*Sodium 0.04 gr/100 ml*

Flacon de 90 ml

**Dans quels cas est-il utilisé ?**

En complément de la réhydratation, traitement de la diarrhée aiguë présumée d'origine bactérienne en l'absence de suspicion de phénomènes invasifs (altération de l'état général, fièvre, signes toxi-infectieux...)

**Comment prendre nifuroxazide  
physiopharm 4 % suspension buvable?**

Voie orale.

**Enfant de plus de 2 ans** : 660 mg par jour soit, 3 cuillères-mesure par jour en 3 prises.

Le traitement ne doit pas excéder 7 jours.

**Dans quels –cas ne pas utiliser ?**

- Hypersensibilité aux dérivés du nitrofurane, ou à l'un des constituants.
- Prématuré, nouveau-né (de 0 à 1 mois) et nourrisson de moins de 2 ans.

**Mises en garde et précautions d'emploi**

**Mises en garde**

La réhydratation peut être l'élément essentiel du traitement des diarrhées aiguës de l'enfant.

Elle devra être systématiquement envisagée.

La prévention ou le traitement de la déshydratation se fera par soluté de réhydratation orale ou par voie intraveineuse.

Il est recommandé d'utiliser les solutés prévus à cet effet et de respecter les modalités de reconstitution et d'utilisation.

- Un apport en chlore et en potassium est nécessaire afin de corriger les pertes digestives.

Il est indispensable de proposer à l'enfant de boire très souvent, tous les ¼ d'heure par exemple.

En cas de diarrhée sévère ou prolongée, de vomissement important ou de refus d'alimentation, une réhydratation par voie intraveineuse devra être envisagée. En cas de diarrhée infectieuse avec des manifestations cliniques suggérant un phénomène invasif, recourir à des antibactériens à bonne diffusion systémique.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

**Précautions d'emploi**

**Chez l'enfant de plus de 2 ans :**

o En cas de prescription d'une réhydratation par soluté de réhydratation, les modalités d'utilisation ainsi que le mode de reconstitution devront être clairement et précisément expliqués.

o En l'absence de nécessité de prescrire une telle réhydratation, il est néanmoins

nécessaire de clairement expliquer la nécessité de:

réhydrater l'enfant par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau est de 2 litres)

maintenir l'alimentation le temps de la diarrhée,

en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.

en privilégiant les viandes grillées, le riz.

La suppression du lait et des laitages devra être envisagée au cas par cas.

Devant une diarrhée chez l'enfant, il convient d'envisager l'éventualité d'un déficit en saccharose avant de prescrire un médicament contenant du saccharose.

Ce médicament contient de l'alcool ; Il est déconseillé chez les patients souffrant de maladie du foie, d'alcoolisme,

d'épilepsie, de même que chez les femmes enceintes.

Ce médicament contient du sodium en tenir compte chez les personnes suivant un régime hyposodé strict.

#### **Interactions :**

##### **Interactions médicamenteuses**

Ce médicament est déconseillé avec les médicaments provoquant une réaction antabuse et les dépresseurs du SNC.

##### **Grossesse**

Ce médicament est destiné à l'enfant. Cependant, en cas d'utilisation dans des circonstances exceptionnelles chez les femmes en âge de procréer, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser le nifuroxazide pendant la grossesse.

Allaitement :

L'allaitement est possible en cas de traitement bref par ce médicament.

**Si vous avez pris du nifuroxazide physiopharm plus qu'il faut ?**

Sans objet

**Aptitude de conduite et utilisation de machine :**

Sans objet

#### **Quels sont les effets indésirables attendus ?**

Possibilité de réactions allergiques (urticatoire et bronchospasme).

#### **Conservation :**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas les 30°

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Après ouverture, ne pas conserver au-delà de 7 jours.

Liste II.

**Fabricant/Conditionneur/ Détenteur de la D.E :**

PHYSIOPHARM Laboratoires 32 A,  
Zone industrielle le Rhumel-Constantine –  
Algérie.

**DERNIERE MISE A JOUR : Juin 2015.**  
**D.E.....**

