CLOTASOL® Crème

Clobétasol Propionate 0.05 %

FORME ET PRESENTATION :

Crème, Tube de 45 g.

COMPOSITION :

Chaque100 gramme de crème contient :
Propionate de Clobétasol .....0.050 g
Excipients : cétomacrogol-1000, alcool cétostéarylique, paraffine liquide, paraffine blanche purifiée, propylène glycol, chlorocrésol, phosphate de sodium, acide phosphate de sodium, EDTA de sodium, orthophosphorique et eau purifiée.

Excipients à effet notoire : propylène glycol, alcool cétostéarylique , chlorocrésol.

CLASSE THERAPEUTIQUE :

Dermocorticoïde.

INDICATIONS :

Ce médicament est un corticoïde local d'activité très forte.
Il est préconisé dans certaines maladies de peau ayant résisté à un corticoïde moins puissant et limitées en surface, mais votre médecin peut le prescrire dans d'autres cas.

CONTRE-INDICATIONS :

N'utilisez jamais CLOTASOL 0,05%, crème dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des composants du médicament,
- lésions ulcérées,
- acné,
- rosacée,
- maladies infectieuses de la peau d'origine virale (herpès, zona, varicelle...), bactérienne (exemple : impétigo...), mycosique (dues à des champignons microscopiques) ou parasitaire,
- chez le nourrisson,
- application sur les paupières.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :
Le traitement doit être limité à 1 à 2 applications par jour.
Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer les effets thérapeutiques.
Le traitement de grandes surfaces nécessite une surveillance du nombre de tubes utilisés.
Certaines dermatoses (psoriasis, dermatite atopique etc.) rendent souhaitable un arrêt progressif, il peut être obtenu par la diminution de la fréquence des applications et/ou par l'utilisation d'un corticoïde moins fort ou moins dosé.
Mode d'administration :
Voie cutanée.
Il est conseillé d'appliquer le produit en touches espacées, puis de l'étaler en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Faites attention avec CLOTASOL 0,05 POUR CENT, crème :
Précautions d'emploi
Un traitement chez l'enfant de moins de 12 ans doit être soumis à une stricte surveillance médicale.
Ne pas appliquer sur le visage sauf en cas de prescription formelle de votre médecin. Ce médicament doit être utilisé en respectant les conseils du médecin :

- Éviter les applications sur une grande surface, sous un pansement occlusif en raison de la possibilité de passage d'une partie du principe actif dans le sang,
- Éviter l'application prolongée, sur le visage, dans les plis,
- Toute irritation ou infection doit être signalée à votre médecin,
- Si une réaction d'intolérance apparaît, le traitement doit être arrêté.

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.
Ce médicament contient de l'alcool cétostéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma)
Ce médicament contient du chlorocrésol et peut provoquer des réactions allergiques

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

AFIN D' EVITER D' EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

En cas de grossesse ou d'allaitement prévenir votre médecin.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, CLOTASOL 0,05 %, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- En cas d'utilisation prolongée, il y a risque d'amincissement et de fragilité de la peau, dilatation de petits vaisseaux sanguins, vergetures, poussée d'acné, rougeurs et irritations autour de la bouche.
- Des cas d'hypertrichose, de dépigmentation, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés.

SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNES DANS CETTE NOTICE, OU SI CERTAINS EFFETS INDESIRABLES DEVIENNENT GRAVES, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN

SURDOSAGE :

Si vous avez utilisé plus de CLOTASOL 0,05 POUR CENT, crème que vous n'auriez dû :
Signes et symptômes
La survenue d'un surdosage aigu est peu probable, cependant, en cas de surdosage chronique ou d'une utilisation excessive, des symptômes résultant d'une sécrétion excessive du cortisol peuvent survenir.
Si vous avez utilisé plus de CLOTASOL 0,05 POUR CENT, crème qu'il ne faut, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION :

Conserver à une température inférieure à 25°C.
Ne pas mettre au réfrigérateur.
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.
NE PAS UTILISER APRÈS LA DATE DE PEREMPTION FIGURANT SUR L'EMBALLAGE EXTERNE.

Liste I.

Décision d'enregistrement n° : 11/07H 174/263

NT 090 d

بيوفارم
Biopharm

Détenteur de la D.E. : BIOPHARM s.p.a
18, Rue de zone industrielle, route de la gare,
Haouche Mahieddine, Réghaia, Alger, Algérie
Fabricant et conditionneur : BIOPHARM s.p.a
Zone Industrielle Oued Smar, Alger, Algérie