

**ASCALOL<sup>u</sup>**  
Benzoate de benzyle  
Lotion 25%

**COMPOSITION :**

**Substance active :** Benzoate de benzyle.....25g

**Excipients :** polysorbate 80, alcool éthylique 96°, eau purifiée.....q.s.p100g

**FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION :**

Lotion, flacon de 125 ml.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:**

Anti-parasitaire

**INDICATIONS :**

Ascalol est indiqué dans le traitement de la gale et des pédiculoses.

**MODE D'ADMINISTRATION/ POSOLOGIE :**

- Voie cutanée
- Application locale

**Traitement de la gale :**

• *Adulte :*

Le soir, de préférence, pour éviter toute toilette ultérieure (y compris celle des mains) pendant la durée de l'application.

Après un bain, se sécher, puis appliquer ASCALOL à l'aide d'un pinceau plat en 1 ou 2 couches sur la totalité de la surface corporelle y compris les organes génitaux, en insistant particulièrement sur les plis, les mains, en évitant seulement le visage et le cuir chevelu.

Au bout de 24 heures, se laver pour éliminer le produit.

Le prurit peut persister pendant plusieurs jours (10 à 15 jours), parfois après une sédation initiale momentanée. Ce prurit post-scabieux ne doit pas conduire à des applications itératives.

Traiter l'entourage simultanément, même en l'absence de signes cliniques.

Désinfecter les vêtements et la literie avec une poudre insecticide.

• *Enfant de moins de 2 ans :*

Même conduite à tenir que chez l'adulte sous réserve des conditions suivantes :

- Il est impératif de se limiter à une application d'une durée inférieure à 12 heures.
- Il est conseillé de bander les mains de l'enfant pour éviter toute ingestion accidentelle.

• *Femme enceinte :* Une seule application d'une durée inférieure à 12 heures.

• *Cas d'une gale infectée :* Traiter l'impétiginisation en priorité.

• *Cas d'une gale irritée ou eczématisée :* ASCALOL peut aggraver temporairement l'irritation ou l'eczématisation. Celle-ci peut être soulagée par un traitement approprié, notamment par un corticoïde local, 24 heures après l'application d'ASCALOL.

**Traitement de la pédiculose :**

*Traitement des poux du cuir chevelu :*

Le soir effectuer un shampoing, puis, appliquer abondamment sur les cheveux la lotion ASCALOL (1/3 du flacon, environ) en frictionnant pendant quelques minutes.

Ne pas essuyer, se coiffer d'un bonnet et le garder toute la nuit.

Le lendemain matin, refaire si possible un shampoing puis renouveler l'application de la lotion ASCALOL. Ne pas essuyer les cheveux lotionnés toute la journée.

Si nécessaire, recommencer le même traitement pendant quelques jours.

*Traitement des poux du corps :*

Désinfecter les vêtements portés et la literie. Faire le même traitement que précédemment s'il y a présence de lentes sur les poils, les passer au peigne fin et les lotionner abondamment. Répéter le traitement 8 jours plus tard.

Traiter en même temps les membres de l'entourage susceptibles d'avoir été contaminés.

#### **CONTRE INDICATIONS :**

Antécédents d'hypersensibilité au benzoate de benzyle.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITEZ A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

#### **MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Pour éviter les effets indésirables locaux (effet systémique), le mode d'emploi doit être respecté, en particulier chez l'enfant de moins de 2 ans.

ASCALOL ne doit pas être appliqué sur les muqueuses.

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

#### **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :**

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

#### **GROSSESSE ET ALLAITEMENT :**

*D'UNE FAON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.*

#### **EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES :**

Sans objet.

#### **EFFETS INDESIRABLES**

Manifestations locales :

- Sensation possible de cuisson immédiate.
- Eczématisation possible, particulièrement accrue en cas d'applications itératives.
- Manifestations générales : convulsions.
- En cas d'ingestion accidentelle.
- En cas de passage cutané : ce risque systémique augment en cas de peau lésée et chez l'enfant de moins de 2 ans.

*SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.*

**SURDOSAGE**

Sans objet

**CONDITIONS DE CONSERVATION :**

- A conserver à une température inférieure à 25° C et à l'abri de la lumière.
- Tenir hors de la portée des enfants.

**DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE :** Mai 2014

**DE N° :**

**Fabricant, conditionneur et détenteur de la DE :**

Laboratoires PHARMIDAL NS

144, Z.I le « RHUMEL»

25000 Constantine - ALGERIE

Tél : (+213) 031661201

Fax : (+213) 031669471

