

Lanzomed® 30 mg

Lansoprazole

Microgranules gastrorésistants en gélule

Composition :

Lansoprazole.....30 mg

Excipients :

saccharose, glycolate d'amidon sodique, amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, povidone, acide oléique, hydroxyde de potassium, hydroxyde d'ammonium, hydroxy propyl methyl cellulose, triethyl citrate, dioxyde de titane, talc, acide methacrylique.

Excipient à effet notoire:

saccharose, sodium, potassium.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un inhibiteur spécifique de la pompe à protons.

Il est préconisé dans les cas suivants :

- le traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien associé ou non à une œsophagite,
- la prévention des rechutes des ulcères duodénaux,
- le traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque.

Posologie et mode d'administration :

- Traitement du reflux gastro-œsophagien :
1 gélule par jour.
- Traitement d'entretien et prévention des récurrences des œsophagites par reflux gastro-œsophagien :
1 à 2 gélules par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux :
1 gélule par jour.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :
1 gélule par jour

Contre-indications :

- Hypersensibilité au lansoprazole.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Effets indésirables :

Lansoprazole est en général bien toléré, les effets secondaires rapportés sont : les nausées, les diarrhées, les coliques abdominales, les vertiges, les céphalées et plus rarement des éruptions cutanées.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS LA NOTICE.

Mise en garde :

Comme les autres médicaments antisécrétoires gastriques, lansoprazole favorise le développement de bactéries intragastrique par diminution du volume et de l'acidité du suc gastrique. Une surveillance particulière devra être effectuée chez les patients recevant du diazépam, de la phénytoïne, des antivitamines K.

Utilisez ce médicament avec précaution chez l'enfant.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse : chez la femme enceinte l'innocuité du lansoprazole n'a pas été établie, par mesure de prudence, il est déconseillé de l'utiliser au cours du premier trimestre de la grossesse.

On s'abstiendra de le prescrire pendant les autres trimestres, sauf en cas de nécessité absolue.

Allaitement : En absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Conditions de conservation:

A conserver à une température inférieure à 25°C, à l'abri de l'humidité

Présentation :

Boîte de 15 gélules contenant des microgranules gastrorésistants sous plaquettes thermoformées.

D. E. n° : 19/09/10 A 167/544

Liste II

Date de révision de la notice : Octobre 2018

Détenteur de la D.E: Sarl World Medicine Limited,
Centre commercial et des affaires Al Qods Niveau 11,
Bu CA 11-05 Cheraga-Alger.
Fabricant: Sarl World Medicine Limited,
Zone industrielle Oued Tlelat, Lot N°06, Oran-Algérie.



WORLD MEDICINE LIMITED
Pharmaceutical Company

لانسوبرازول حبيبات دقيقة مقاومة لحموضة المعدة في كبسولة

التركيب :

لانسوبرازول 30 ملغ

السواغات:

سكاروز ، غليكولات نشاء الصوديوم ، نشاء الذرة ، لوريل
سدولفات الصوديوم ، بوفيدون ، حمض الأوليك ، هيدروكسيد
البوتاسيوم، هيدروكسيد الامونيوم، هيدروكسي بروبيل ميتيل
سيليلوز ، ثلاثي ايتيل السيترات ، ثنائي اكسيد التيتان ،
تالك ، حامض الميتاكريليك

سواغ ذو تأثير معلوم:

سكاروز ، صوديوم ، بوتاسيوم.

دواعي الاستعمال

هذا الدواء ، هو مثبط خاص لمضخة البروتونات. يوصف في الحالات
التالية :

- علاج أعراض الارتداد المعدي المريئي مع أو بدون التهاب المري
- الوقاية من رداغات القرع العفجية.
- علاج واق للجروح المعدية والعفجية الناتجة عن مضادات
الالتهاب الغير ستيرويدية عند المرضى المعنيين بالخطر.

كيفية ومقادير الاستعمال

- علاج الارتداد المعدي المريئي : كبسولة في اليوم.
- علاج محافظ وواقى من رداغات التهابات المري نتيجة
الجزر المعدي المريئي : كبسولة إلى 2 في اليوم.
- علاج محافظ للقرع العفجية : كبسولة في اليوم.
- علاج واق للجروح المعدية والعفجية الناتجة عن مضادات
الالتهاب الغير ستيرويدية : كبسولة في اليوم.

موانع الاستعمال

- حساسية مفرطة اتجاه اللانسوبرازول

في حالة الشك لا تردد في طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

يشكل عام تحمل لانسوبرازول حسن، الأعراض الجانبية التي
ذكرت هي : غثيان، إسهال، آلام بطنية، دوران، آلام في الرأس
وناذرا طفق جلدي.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي في حالة ظهور أي تأثير غير
مرغوب فيه وليس مذكور في هذه القسيمة.

تحذير
كباقي الأدوية الأخرى المضادة للإفراز المعدي، لانسوبرازول يساعد
على تطور بكتيريا معدية داخلية وذلك بانخفاض حجم وحموضة
العصارة المعدية. يجب أن تكون هناك مراقبة خاصة للمرضى
المعالجين بالديازيبام، الفينيتوين، مضادات الفيتامين K.
استعمل هذا الدواء بحذر عند الطفل.

بسبب وجود السكاروز يمنع استعمال هذا الدواء في حالة
حساسية مفرطة لسكر الفركتوز، في حالة مرض سوء
امتصاص الغلوكوز أو سكر الغالاكتوز أو ندرة انزيم السكاراز-
ايزومالتاز(امراض الايض النادرة).

لاحتباب أي تفاعل مع أدوية أخرى يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي
بكل علاج يستعمل في نفس الوقت.

حالات الحمل والرضاعة

الحمل : عند المرأة الحامل عدم الضرر بالانسوبرازول غير محدد.
استعمال هذا الدواء خلال الفصل الأول من الحمل غير منصح به.
نمتنع عن وصفه خلال الفصول الأخرى، إلا عند الضرورة المطلقة.
الرضاعة :

لعدم وجود معلومات حول تسرب هذا الدواء في حليب الام
فالرضاعة غير منصح بها خلال فترة العلاج
في حالة الشك لا تردد في طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

شروط الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25°، بعيدا عن الرطوبة.

التقديم

علبة 15 كبسولة تحتوي على حبيبات مقاومة لحموضة المعدة.

رقم التسجيل : 19/09/10 A 167/544

قائمة ||

تاريخ مراجعة النشرة : أكتوبر 2018

صاحب رخصة التسجيل : ش.م.د.م. وورلد ميديسين ليميتاد
مركز التجارة والأعمال القدس مستوى 11
BU CA 11-05 الشارقة-الجزائر.

المصنع : ش.م.د.م. وورلد ميديسين ليميتاد
المنطقة الصناعية حصة رقم 6: واد تليلات-وهران-الجزائر



WORLD MEDICINE LIMITED
Pharmaceutical Company