

Azithromycine

Que contiennent les gélules de BINOZYT® ?

Une gélule contient de l'azithromycine dihydrate, correspondant à 250 mg d'azithromycine.

Excipient à effet notoire : lactose

Forme pharmaceutique : gélules

Conditionnement : boîte de 6 gélules.

Qu'est ce que BINOZYT® ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des macrolides qui agit contre certaines bactéries.

Dans quels cas utilise-t-on BINOZYT® ?

BINOZYT® est préconisé dans le traitement des affections suivantes qui sont causées par des agents pathogènes sensibles à l'azithromycine :

- infections des voies respiratoires supérieures et inférieures, comme les infections ORL, les bronchites et les pneumonies
- infections cutanées et des parties molles
- infections des voies urinaires basses et des organes sexuels.

Dans quels cas ne doit-on pas utiliser BINOZYT® ?

Lorsque le patient a déjà eu des réactions allergiques après la prise de Binozyt ou de médicaments similaires comme par exemple l'érythromycine.

Vous devez prendre l'avis de votre médecin en conséquence.

Peut-on utiliser BINOZYT® durant la grossesse ou l'allaitement ?

Le Binozyt® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement ! EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Vous devez informer votre médecin :

- de tout trouble de la fonction hépatique, toute affection rénale, tout trouble gastro-intestinal grave avec vomissements et diarrhées.
- En cas d'allergie ou d'asthme prononcé.
- En cas de grossesse.

Ne laissez pas les gélules de BINOZYT® à la portée des enfants !

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Peut-on utiliser BINOZYT® en association avec d'autres médicaments ?

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Par exemple, lors de l'utilisation parallèle d'alcaloïde de l'ergot de seigle (comme par exemple l'ergotamine), des réactions indésirables peuvent survenir. La warfarine, la cyclosporine, la digoxine et la térfénadine doivent être prises en suivant scrupuleusement les instructions du médecin.

En cas de prise de médicament contre l'acidité gastrique, un intervalle de 2 à 3 heures doit être respecté entre la prise des deux médicaments.

A quelle fréquence et comment prend-on les gélules de

Azithromycine

Que contiennent les gélules de BINOZYT® ?

Une gélule contient de l'azithromycine dihydrate, correspondant à 250 mg d'azithromycine.

Excipient à effet notoire : lactose

Forme pharmaceutique : gélules

Conditionnement : boîte de 6 gélules.

Qu'est ce que BINOZYT® ?

Ce médicament est un antibiotique de la famille des macrolides qui agit contre certaines bactéries.

Dans quels cas utilise-t-on BINOZYT® ?

BINOZYT® est préconisé dans le traitement des affections suivantes qui sont causées par des agents pathogènes sensibles à l'azithromycine :

- infections des voies respiratoires supérieures et inférieures, comme les infections ORL, les bronchites et les pneumonies
- infections cutanées et des parties molles
- infections des voies urinaires basses et des organes sexuels.

Dans quels cas ne doit-on pas utiliser BINOZYT® ?

Lorsque le patient a déjà eu des réactions allergiques après la prise de Binozyt® ou de médicaments similaires comme par exemple l'érythromycine.

Vous devez prendre l'avis de votre médecin en conséquence.

Peut-on utiliser BINOZYT® durant la grossesse ou l'allaitement ?

Le Binozyt® ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement ! EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde et précautions d'emploi :

Vous devez informer votre médecin :

- de tout trouble de la fonction hépatique, toute affection rénale, tout trouble gastro-intestinal grave avec vomissements et diarrhées.
- En cas d'allergie ou d'asthme prononcé.
- En cas de grossesse.

Ne laissez pas les gélules de BINOZYT® à la portée des enfants !

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Peut-on utiliser BINOZYT® en association avec d'autres médicaments ?

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Par exemple, lors de l'utilisation parallèle d'alcaloïde de l'ergot de seigle (comme par exemple l'ergotamine), des réactions indésirables peuvent survenir. La warfarine, la cyclosporine, la digoxine et la térfénadine doivent être prises en suivant scrupuleusement les instructions du médecin.

En cas de prise de médicament contre l'acidité gastrique, un intervalle de 2 à 3 heures doit être respecté entre la prise des deux médicaments.

A quelle fréquence et comment prend-on les gélules de BINOZYT® ?

avec une quantité suffisante de liquide.

- En cas d'infection des voies urinaires basses et des organes génitaux, 4 gélules à 250 mg le même jour en une seule prise pour les adultes.
- Pour toutes les autres infections, les adultes, adolescents et enfants dont le poids est supérieur à 45 kg prendront 2 gélules à 250 mg pendant 3 jours. Les gélules doivent être prises au minimum une heure avant le repas ou au plus tôt deux heures après le repas.

Les gélules doivent être ingérées sans les croquer

Prenez la dose prescrite par le médecin durant trois jours consécutifs si possible à la même heure.

Vous ne pouvez pas interrompre votre traitement sans avertir votre médecin.

Produit liste I

Quels peuvent être les effets non souhaités d'un traitement par BINOZYT® ?

Le Binozyt® est en général bien toléré, mais les médicaments peuvent également induire des réactions indésirables.

- Les réactions d'hypersensibilité telles réactions cutanées et les réactions des muqueuses, par exemple les rougeurs avec ou sans démangeaisons, la photosensibilité, les douleurs articulaires, les gonflements et l'urticaire, ne surviennent que rarement.
- Occasionnellement, des troubles peuvent survenir sous la forme de perte d'appétit, de troubles digestifs, de selles molles, de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements, de diarrhées, de constipation, de ballonnements.
- Des cas de troubles de la fonction hépatique, y compris l'hépatite ont été notifiés.
- Des néphrites et des insuffisances rénales ont été notifiées.
- Dans de rares cas, des modifications de l'héмограмme se sont produites.
- Des palpitations, des douleurs de la poitrine, et des troubles du rythme cardiaque ont été notifiés.
- Les réactions cutanées ne surviennent que rarement, partiellement accompagnées d'implication au niveau de la muqueuse.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Indications sur la date limite d'utilisation et sur la conservation :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Conservé les gélules de Binozyt® dans l'emballage original ne dépassant pas + 25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Médicament enregistré sous le N° :

10/04/13E 176/050

Titulaire - exploitant et fabricant :

Sandoz,
Zone Industrielle Oued Smar W. Alger

Date de révision de la notice :

Janvier 2008

Binozyt® est **SANDOZ** sont des marques déposées de Novartis