

# AMODEX® Gé AMOXICILLINE

## Identification du médicament

### Formes pharmaceutiques et compositions

#### Amoxidex® Gé 500 mg, gelule

Amoxicilline (sous forme de trihydrate) ..... 500 mg.  
Excipients : Stéarate de magnésium, gélatine, érythrosine (E127), indigotine (E132), dioxyde de titane (E171), oxydes de fer (E172) q.s.p. une gelule  
Boîte de 12 gelules.

#### Amoxidex® Gé 250 mg / 5 ml, poudre pour suspension buvable

Amoxicilline (sous forme de trihydrate) ..... 3 g.  
Excipients : Benzoate de sodium, citrate de sodium, silice, edétate de sodium, arôme fraise, arôme citron, glycyrrhizinate d'ammonium, saccharose q.s.p. 30 g.  
Flacon de 30 g de poudre correspondant après reconstitution à 60 ml de sirop (12 mesures).  
Le conditionnement contient une cuillère-mesure.

Une cuillère-mesure (5 ml) contient 5 mg de benzoate de sodium, 6 mg de sodium et 2 g de saccharose.

#### Amoxidex® Gé 500 mg / 5 ml, poudre pour suspension buvable

Amoxicilline (sous forme de trihydrate) ..... 6 g.  
Excipients : Benzoate de sodium, citrate de sodium, silice, edétate de sodium, arôme fraise, arôme citron, glycyrrhizinate d'ammonium, saccharose q.s.p. 30 g.  
Flacon de 30 g de poudre correspondant après reconstitution à 60 ml de sirop (12 mesures).  
Le conditionnement contient une cuillère-mesure.

Une cuillère-mesure (5 ml) contient 5 mg de benzoate de sodium, 11 mg de sodium et 1,7 g de saccharose.

### Classe pharmacothérapeutique :

ANTIBIOTIQUES ANTIBACTÉRIENS de la famille des bêta-lactamines du groupe des amino-pénicillines (J. Anti-infectieux).

### Nom et adresse du fabricant :

Laboratoires CONTINENTAL PHARM  
21 Lot 21/29 En-Nedjma Oran - Algérie

### Dans quels cas utiliser ce médicament ?

Amoxidex® Gé est indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles. Ce médicament est indiqué également chez l'adulte dans le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum.

### Attention !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :  
- allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines ou encore à l'un des autres constituants de ce médicament,  
- mononucléose infectieuse (risque accru d'effets indésirables cutanés).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en association avec le méthotrexate (médicament immunosuppresseur).

### Mises en garde spéciales

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaisons...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à un médecin.

Avant de prendre ce traitement, prévenir votre médecin si lors de la prise d'un antibiotique pour un traitement antérieur (même avec une autre famille d'antibiotique) vous avez présenté un urticaire ou d'autres éruptions cutanées, démangeaisons, oedème de Quincke.

- **GÉLULES** : la prise de gelule est contre indiquée chez l'enfant avant 6 ans, car il peut avaler de travers et s'étouffer.

- **POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE** : en raison de la présence de saccharose, ces formes ne doivent pas être utilisées en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi :

- Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale connue.  
Boire abondamment pendant la durée du traitement  
- Ce médicament peut fausser certains résultats d'analyses biologiques : test de Coombs, glycémie, protéines totales sériques, recherche de glucose dans les urines. Prévenez votre médecin de la prise d'amoxicilline, si ces examens vous sont prescrits.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

**POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE** : Ne tenir compte de la teneur en sodium que chez les enfants qui suivent un régime sans sel strict. Tenir compte de la teneur en saccharose dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète. En raison de la présence de benzoate de sodium, ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

**Interactions médicamenteuses et autres interactions**  
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS et notamment avec le méthotrexate, SIGNALÉZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### Grossesse et Allaitement :

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse.

L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption sur la peau, candidose (infection due à certains champignons microscopiques), avertissez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite à tenir car ces effets sur votre enfant sont peut-être dus à ce médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

### Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :

Benzoate de sodium, sodium et saccharose (poudre pour suspension buvable).

### Comment utiliser ce médicament ?

#### Posologie

La présentation en gelule est réservée à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans (cf. Mises en garde). Dans certains cas, il existe d'autres présentations d'amoxicilline plus adaptées, en particulier pour des posologies supérieures à 2 g par jour chez l'adulte.  
DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

La posologie varie selon la pathologie qui est traitée.

A titre indicatif, les doses prescrites peuvent varier :

- Chez l'adulte : de 1 g à 6 g par 24 heures.
  - Chez l'enfant : de 25 mg / kg à 150 mg / kg par 24 heures.
- Les doses doivent être modifiées en cas d'insuffisance rénale.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

- **GÉLULES** : avaler les gelules sans les ouvrir avec un verre d'eau.  
- **POUDRE POUR SUSPENSION BUVABLE** : Remplir le flacon avec de l'eau non gazeuse jusqu'au trait. Agiter jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Si nécessaire, compléter à nouveau avec de l'eau jusqu'au trait et agiter. Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

- **Amoxidex® Gé 250 mg, poudre pour suspension buvable** : Utiliser la cuillère-mesure fournie avec le flacon. La cuillère-mesure comporte 2 graduations :

- 1 cuillère-mesure contenant 5 ml, soit 250 mg d'amoxicilline.
- 1/2 cuillère-mesure contenant 2,5 ml, soit 125 mg d'amoxicilline.

Bien rincer la cuillère-mesure après chaque utilisation.

- **Amoxidex® Gé 500 mg, poudre pour suspension buvable** : Utiliser la cuillère-mesure fournie avec le flacon en la remplissant jusqu'au bord (une cuillère-mesure contient 5 ml soit 500 mg d'amoxicilline). Bien rincer la cuillère-mesure après chaque utilisation.

### Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Ce médicament peut être pris indifféremment à jeun, avant, pendant ou après les repas.

### Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. La disparition de la fièvre, ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri, l'éventuelle impression de fatigue, n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

### Conduite à tenir en cas de surdosage

Prévenir immédiatement votre médecin.

### Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Le traitement doit être poursuivi normalement, sans tenir compte de la dose oubliée.

### Effets non souhaités et gènes

CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

■ Allergie pouvant se manifester de façon plus ou moins grave : éruption sur la peau, augmentation de certains globules blancs (oedème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), gêne respiratoire, exceptionnellement choc allergique.

■ Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose (infection due à certains champignons microscopiques).

■ Plus rarement

-Augmentation modérée et transitoire des enzymes du foie (transaminases).

-Anémie, baisse des globules blancs et des plaquettes.

-Atteinte rénale.

En cas de diarrhée survenant au cours du traitement par ce médicament, prenez rapidement avis auprès de votre médecin.

### Ne jamais prendre de traitement antidiarrhéique sans prescription médicale.

SIGNALÉZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

### Conservation

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION (Poudre pour suspension buvable) :

Ne pas conserver la suspension reconstituée plus de 7 jours à température ambiante, ou plus de 10 jours à +4 °C.

### Conseils/éducation sanitaire

#### Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs. La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques. Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas : la dose à prendre, les moments de prise et la durée de traitement.

### En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2) Respectez strictement votre ordonnance.

3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5) Une fois votre traitement terminé, rappez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

Liste : I

Date de révision de la notice : juillet 2010

# أمودكس® Gé

## أموكسيسيلين

يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل تناولكم هذا الدواء.  
إذا كان لديكم أسئلة أو شك فاطلبوا مزيداً من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني.  
احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون الرجوع إليها.

### التعريف بالدواء

الأشكال الصيدلانية والتريكيب

**أمودكس Gé 500 ملغ، كبسولات.**

أموكسيسيلين (على شكل ثلاثي المائيات) 500 ملغ.  
السواغات: ستيرات المغنسيوم، جلاكتين، إريثروزين (E127)،  
ديفوفين (E132)، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، أكاسيد الحديد (E172)  
كمية كافية لكبسولة واحدة.  
عقبة غليظة 12 كبسولة.

**أمودكس Gé 250 ملغ/5 مل، مسحوق لمعلق للشرب.**

أموكسيسيلين (على شكل ثلاثي المائيات) 3.  
السواغات: بنزوات الصوديوم، سترات الصوديوم، سيليكا،  
انديات الصوديوم، نكهة الفراولة، نكهة الليمون، غليسير هيزين  
الأمويوم، ساكاروز كمية كافية ل30 غ.  
قارورة تحتوي على 30 غ من المسحوق ما يعادل بعد التحضير  
60 مل من الشراب (12 معيار). مرفق مع القارورة في العبوة  
ملقعة- معيار.

يحتوي كل معيار (5مل) على 5 ملغ من بنزوات الصوديوم،  
6 ملغ من الصوديوم و 2 غ من السكر.

**أمودكس Gé 500 ملغ/5 مل، مسحوق لمعلق للشرب.**

أموكسيسيلين (على شكل ثلاثي المائيات) 6 غ.  
السواغات: بنزوات الصوديوم، سترات الصوديوم، سيليكا،  
انديات الصوديوم، نكهة الفراولة، نكهة الليمون، غليسير هيزين  
الأمويوم، ساكاروز كمية كافية ل30 غ.  
قارورة تحتوي على 30 غ من المسحوق ما يعادل بعد التحضير  
60 مل من الشراب (12 معيار). مرفق مع القارورة في العبوة  
ملقعة- معيار. يحتوي كل معيار (5مل) على 5 ملغ من  
بنزوات الصوديوم، 11 ملغ من الصوديوم و 1,7 غ من السكر.

**التصنيف الدولي العلاجي**  
مضاد حيوي ضد البكتيريا من زمرة البيتا-لاكتامين مجموعة  
الامينوبنسلينات. (مضاد للحمج)  
اسم وعنوان المنتج  
مخابر كونتونيون فالرم

م.ص. قطعة رقم 29/21 النجمة، وهران - الجزائر.  
**الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء**

**يوصى باستعمال أمودكس Gé**  
لمعالجة التهابات الحنجرة الناشئة عن جراثيم حساسة. يوصى  
أيضا باستعمال هذا الدواء عند البالغين في معالجة بعض  
التفرحات المعدية أو اثنا عشرية.

**التحاليل التي لا يستعمل فيها هذا الدواء**  
يمنع استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:  
- فرط الحساسية للبنسلينات أو للسيفالوسبورينات أو أيضا  
- لإحدى مكونات الدواء.  
- داء وحيدات النواة الانتاني (احتمال تزايد الظاهر الجلدية  
غير المرغوبة).

عموما ينبغي عدم استعمال هذا الدواء مشاركة مع  
الميترونيدازول (علاج كابيت للمناعة).

**تحذيرات خاصة**  
يجب إبلاغ الطبيب فوراً عن كل ظاهرة تحسسية (طفح جلدي،  
حكة) قد تحدث أثناء المعالجة. قبل تناولكم هذا العلاج، عليكم  
بإبلاغ طبيبك إذا سبق وحدث لكم شرى أو طفح جلدي آخر،  
حكة أو وئمة وعائية عصبية عند معالجتكم بمضاد حيوي  
(حتى لو كان ينتمي إلى زمرة مختلفة).

كما ينبغي عدم استعمال الكبسولات لدى الطفل أقل  
من 6 سنوات من العمر خوفاً من بلعها بالعرض واختلافه.  
- مسحوق المعلق للشرب: نظراً لاحتوائه على الساكاروز  
يمنع استعمال هذا الشكل الصيدلاني لدى المرضى الذين يشكون  
من عدم تحمل الفركتوز أو من متلازمة سوء امتصاص  
الغلوكوز والغالاكتوز أو من نقص في الأنزيم سكر الأيزومالتاز  
(مرض استقلابي نادر).

**احتياطات الاستعمال**  
- عليكم إبلاغ طبيبك في حال وجود مرض كلوي.  
- عليكم بالشرب بكثرة أثناء مدة العلاج.

هذا العلاج قد يحرف نتائج بعض الفحوصات الحيوية: اختبار كومبز،  
سكر الدم، بروتينات الدم، كشف السكر في البول. يجب إبلاغ الطبيب  
بتناولكم الأموكسيسيلين في حالة طلب منكم إجراء مثل هذه  
الفحوصات.

- **مسحوق المعلق للشرب:** يجب الأخذ بالاعتبار كمية الصوديوم  
الموجودة في الدواء فقلدى الأطفال الخاضعين لنظام حماية خلال  
شماما من الملح.

يجب الأخذ بالاعتبار كمية السكر الموجودة في الدواء في الحصة  
اليومية لدى الأطفال الخاضعين لنظام حماية قليل السكريات أو  
المصابين بالسكري.

نظراً لاحتوائه على بنزوات الصوديوم، هذا الدواء قد يسبب  
التهاب البنزوة، العينين، والمخاطبات.  
**التداخلات الدوائية وغيرها من التداخلات**  
لتفادي أية تداخلات دوائية محتملة، وخصوصاً مع  
الميترونيدازول، يجب بانتظام إبلاغ الصيدلاني عن كل  
دواء آخر قيد تناولكم.

**الحمل والإرضاع**  
يمكن تناول هذا الدواء أثناء الحمل إذا لزم الأمر.  
الإرضاع يمكن من تناول هذا الدواء. إذا حدثت عند المولود  
الرضيع اضطراب مماثل للإسهال أو طفح جلدي أو داء المبيضات  
(خمج ناشئ عن بعض الفطريات الدقيقة) عليكم إبلاغ الطبيب فوراً  
فإنه يمكن أن يترجم على ما يلزم عمله. فقد يكون هذا الدواء سبب  
هذه الظواهر عند طفلكم.

بصفة عامة يستحسن دائماً استشارة طبيبك أو الصيدلاني قبل  
تناولكم أي دواء أثناء فترة الحمل أو الإرضاع.  
بيان السواغات الواجب معرفتها لاستعمال بدون عواقب عند  
**بعض الأشخاص:**  
بنزوات الصوديوم، الصوديوم والساكاروز (في مسحوق المعلق  
للشرب).

**كيف يستعمل هذا الدواء؟**  
المقايير  
الكبسولات شكل مخصص للبالغين والأطفال فوق 6 سنوات من  
العمر (راجعوا تحذيرات خاصة). هناك أشكال أخرى  
للأموكسيسيلين أكثر ملائمة لبعض الحالات، خاصة للمقايير التي  
تزيد عن 2 غ في اليوم عند البالغين.  
في جميع الأحوال، يجب التقيد تماماً بوصفة طبيبك.  
تختلف المقايير وفقاً للمرض المراد معالجته. للدلالة فقط قد  
تترجم المرواح الصيدلانية:

- عند البالغين: من 1 غ إلى 6 غ في 24 ساعة.  
- عند الأطفال: من 25 ملغ إلى 150 ملغ لكل كيلوغرام وزن في 24 ساعة.  
تعمل هذه الجرعات في حالة القصور الكلوي.

**كيفية الاستعمال وطريق الإعطاء**  
يعطى عن طريق الفم.  
- **الكبسولات:** تلبغ الكبسولات كاملة بدون فتحها مع كوب ماء.  
- **مسحوق المعلق للشرب:** تملئ القارورة بماء غير غازي لغاية  
العلامة وترج جيداً حتى الحصول على معلق متجانس. يكمل  
بالماء حتى العلامة إذا لزم الأمر وترج. يجب رج القارورة جيداً  
قبل كل استعمال.

**أمودكس Gé 250 ملغ/5 مل، مسحوق لمعلق للشرب.**  
ينبغي استعمال الملقعة- المعيار المرفقة مع القارورة.  
تحمل الملقعة - المعيار درجتي قياس:  
- الملقعة - المعيار تسع 5 مل أي 250 ملغ أموكسيسيلين.  
- ½ ملقعة - معيار تسع 2,5 مل، أي 125 ملغ أموكسيسيلين.  
يجب غسل الملقعة - المعيار جيداً بعد كل استعمال.  
**أمودكس Gé 500 ملغ/5 مل، مسحوق لمعلق للشرب.**  
ينبغي استعمال الملقعة - المعيار المرفقة مع القارورة بملئها حتى  
العلامة (الملقعة - المعيار تسع 5 مل أي 500 ملغ أموكسيسيلين).  
يجب غسل الملقعة - المعيار جيداً بعد كل استعمال.  
عدد مرات تناول الدواء و موعدها

يمكن تناول هذا الدواء بلا تمييز سواء على الريق أو قبل أو أثناء  
أو بعد وجبات الطعام.  
**مدة المعالجة**  
للحصول على الفعالية المطلوبة، يجب استعمال هذا المضاد  
الحيوي بانتظام بالجرعات التي وصفها لكم الطبيب ولطول المدة  
التي نصح بها. زوال الحمى أو أية ظاهرة أخرى لا تعني أنكم  
شقيتم تماماً.

ان الاحتمال بالشعور بالتعب ليس عائد للمضاد الحيوي بل  
للإصابة الخفيفة نفسها. لذلك فإن إقباص المقايير أو وقف  
العلاج سوف لا يكون له تأثير على هذا الشعور بل سوف يؤخر  
شفاكم.

**طريقة التعامل مع حالة فرط الجرعة.**  
يجب إبلاغ طبيبك فوراً

**طريقة التعامل مع حالة نسيان تناول جرعة أو أكثر.**  
يجب عدم الأخذ في الاعتبار الجرعة المنسية بل مواصلة  
المعالجة طبيعياً.

### التأثيرات غير المرغوبة و المزعجة

مثل كل مادة فعالة قد يسبب هذا الدواء عند بعض الأشخاص  
تأثيرات نوعاً ما مزعجة.

■ تفاعلات تحسسية قد تتظاهر بشكل مختلف الشدة: طفح جلدي،  
كثرة بعض الكريات البيضاء في الدم، وئمة وعائية عصبية  
(انتفاخ مفاجئ في الوجه والعنق)، عسر التنفس واستثنايا  
صدمة تأقية.

■ اضطراب هضمية: غثيان، إقياء، إسهال، داء المبيضات  
(إصابة سببها بعض الفطريات الدقيقة)،

■ تأثيرات أقل حدوثاً:  
- ارتفاع معتدل وعابر للأنزيمات الكبد (ناقلات الأمين).  
- فقر الدم نقص في الكريات البيضاء نقص في الصفائح.

- مرض في الكلى.  
في حال حدوث إسهال أثناء المعالجة بهذا الدواء، يجب استشارة  
طبيبكم فوراً.

لا تتناولوا أموية ضد الإسهال بدون وصفة طبية.

يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني عن كل ظاهرة غير مرغوبة  
أو مزعجة غير مذكورة في هذه النشرة.

**الحفظ**  
يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور  
على العبوة الخارجية.

**احتياطات خاصة بالحفظ (النسبة لمسحوق المعلق للشرب):**  
يجب عدم الاحتفاظ بالمحلول المجهز لمدة تزيد عن 7 أيام في  
درجة حرارة الغرفة أو لمدة تزيد عن 10 أيام في درجة حرارة  
4°م.

**إرشادات/ثقافة صحية**  
**ماذا يجب معرفته عن المضادات الحيوية**

المضادات الحيوية علاجات فعالة في مكافحة الأحماج الناتجة  
عن الجراثيم.

ليس لها فاعلية على الأحماج الحيوية.

لذلك فقد اختار طبيبك أن يوصف لكم هذا المضاد الحيوي لأنه  
يلائم تماماً حالتكم ومرضكم الحالي.

للجراثيم القدرة على البقاء حية أو التكاثر رغم تأثير المضاد  
الحيوي وتسمى هذه الظاهرة بالمقاومة الدوائية وتجعل بعض  
العلاجات بالمضادات الحيوية غير فعالة.  
تزداد المقاومة الدوائية بالاستعمال المفرط أو غير الملائم  
للمضادات الحيوية.

قد تتشعوب احتمال ظهور جراثيم مقاومة وبالتالي تؤخرون  
شفاكم أو حتى تجعلون معالجتكم بدون جدوى إذا لم تتقيدوا

- بالجرعة المطلوبة منكم تناولها،  
- بموع تناولها،  
- بمدة المعالجة.

**إذا المحافظة على فاعلية هذا الدواء عليكم:**

- 1) عدم استعمال المضادات الحيوية إلا بناء على وصفة من طبيبك.
- 2) التقيد التام بوصفة الطبيب.
- 3) عدم إعادة استعمال مضاد حيوي بدون رأي الطبيب حتى لو كنتم تظنون معالجتكم مرض مشابه ظاهرياً.
- 4) عدم إعطاء بئناً علاجكم المضاد الحيوي لشخص آخر فقد يكون غير ملائم لحالته.
- 5) عند انتهاء معالجتكم، يجب احضار جميع العوات المستعملة للصيدلاني ليتم إعدامها وفقاً للوسائل السليمة والمناسبة لهذا الدواء.

### القائمة 1

تاريخ مراجعة النشرة: 2010