

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est déconseillé au cours du traitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Comprimé sécable

sanofi aventis**Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT**COMPOSITION**

Pour un comprimé sécable:

Molsidomine..... 2 mg.

Excipients : lactose monohydraté, crospovidone, stéarate de magnésium, macrogol 6000.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sécable. Boîtes de 30.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

AUTRE VASODILATEUR EN CARDIOLOGIE

TITULAIRE D'AMM:

Winthrop Pharma Saïdal spa

Microzone d'activités, lots 29 à 31, Bt B, Hydra - Alger

Fabriqué par:

Winthrop Pharma Saïdal spa

ZI oued smar, Alger

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un antiangineux.

Ce médicament est préconisé dans le traitement préventif de l'angine de poitrine.

CORVASAL n'est pas un médicament adapté au traitement de la crise d'angine de poitrine.

ATTENTION !**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ

dans les cas suivants :

- Hypotension artérielle importante avec état de choc.
- Association au VIAGRA (sildénafil) (médicament traitant les troubles de l'érection) :
 - . si vous êtes actuellement traité par la molsidomine, le sildénafil ne doit pas être utilisé,
 - . en cas de traitement par sildénafil, la molsidomine ne doit pas être utilisée.
- Ce médicament est généralement déconseillé en cas d'allaitement (cf. rubrique Grossesse et allaitement).

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- L'association de la molsidomine au VIAGRA (sildénafil) risque de provoquer une chute importante et brutale de la pression artérielle pouvant entraîner une lipothymie (*malaise passager*), une syncope ou un accident cardiaque.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Une légère diminution de la tension artérielle est habituelle sous molsidomine. Ce médicament doit être utilisé avec précaution en cas de tension artérielle basse, ainsi que chez les sujets âgés, en cas d'hypovolémie (*diminution du volume total de sang*), et chez les sujets déjà traités par une substance vasodilatatrice.

En cas d'insuffisance hépatique, il est recommandé d'augmenter la posologie de manière progressive.

Il n'est pas logique d'associer la molsidomine avec les dérivés nitrés retard, dans la mesure où leur mécanisme d'action est similaire.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec le VIAGRA (sildénafil), IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lactose.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT**POSOLOGIE**

- Angor d'effort (posologie usuelle) :

$\frac{1}{2}$ à 1 comprimé 3 fois par jour, en général aux repas du matin, du midi et du soir (soit 3 à 6 mg de molsidomine).

- Angor de repos et angor d'effort sévère :

1 comprimé 4 fois par jour (soit 8 mg de molsidomine).

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- maux de tête et légère baisse de la pression artérielle en début de traitement. Ces effets régressent spontanément en quelques jours ;
- exceptionnellement : hypotension orthostatique (*chute de la tension artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges*), troubles digestifs, démangeaisons.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à + 25°C et à l'abri de la lumière.

PRÉSCRIPTION

Liste I

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Octobre 2009.