

Mégamylase®

Alfa-amylase 3000 U.CEIP/cp

COMPRIMÉS ENROBÉS

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

ALFA-AMYLASE..... 3000 U.CEIP.

pour un comprimé enrobé

* soit 2142,9 unités Pharmacopée Européenne.

Excipients : stéarate de magnésium, sorbitol, gomme laque, copolymère de méthacrylate alcalin (eudragit E100), talc, gélatine, saccharose, gomme arabique, dioxyde de titane, jaune orangé S, cire de carnauba, cire de lignite.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE:

Jaune orangé S, Sorbitol, Saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés enrobés, boîte de 24.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ENZYMES A VISÉE ANTI-INFLAMMATOIRE

(R: Système Respiratoire)

DETENTEUR DE LA D.E. :

Laboratoire TOP PHARM
Domaine de Mont Causson
BP 50, 31250 REVEL

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

BIOCODEX 7, avenue Gallieni
94250 Gentilly

FABRICANT :

ROTTENDORF PHARMA

Z.I. n° 2 de Prouvy - Rouvignies.

1, rue de Nungesser 59121 PROUVY. France.

CONDITIONNÉ PAR :

Pharmaceutical Laboratory International (PLI)
10, Route de Aïn Benian
Chéraga - Alger

DANS QUELS (S) CAS UTILISER CE

MÉDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre de l'adulte.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE

MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

- Antécédents d'allergie à l'alfa-amylase ou à l'un des composants du comprimé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments ...) Consultez votre médecin.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSOLOGIE

RÉSERVÉ À L'ADULTE

Il existe une forme sirop plus adaptée à l'enfant.

- 1 comprimé, 3 fois par jour au cours des repas.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avaler les comprimés, sans les croquer, avec un verre d'eau.

DURÉE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS:

- réactions allergiques : dans ce cas arrêtez le traitement.

SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

N° de D.E. : 15/00/04 C 026/104

Date de mise à jour de la notice en Algérie :
Décembre 2015.