

ADAPALENE novagenerics®

Gel 0.1 % Tube de 30 g

Adapalène

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Identification du médicament

Composition

La substance active est :

Adapalène (DCI)0.1g pour 100g

Excipients : hydroxybenzoate de méthyle, phénoxyéthanol, propylène glycol, carbomer 934, disodium EDTA, alcool isopropylique, menthol, huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée, parfum citron cologne, triéthanolamine, eau purifiée.

Excipients à effet notoire : propylèneglycol, hydroxybenzoate de méthyle

Forme pharmaceutique et présentation : Gel 0.1 % : Tube de 30 g

Classe pharmaco-thérapeutique : Antiacnéique local (D : dermatologie).

liste I

Détenteur de la D.E : NOVAPHARM TRADING, BP 152, Route de Koléa Boulsmail W. Tipaza. Algérie.

Fabriquant et conditionneur : NOVAPHARM TRADING, BP 152, Route de Koléa Boulsmail W. Tipaza. Algérie.

Dans quel(s) cas utiliser ADAPALENE novagenerics® ?

Acné de sévérité moyenne, particulièrement indiqué dans l'acné rétionnelle.

Comment utiliser ADAPALENE novagenerics® ?

Voie cutanée.

Appliquer la valeur d'un pois de gel en la répartissant sur les lésions acnéiques en évitant les yeux et les lèvres, une fois par jour avant le coucher après avoir lavé et bien séché la peau.

Dans quels cas ne pas utiliser ADAPALENE novagenerics® ?

Hypersensibilité à l'un des composants.

MISE EN GARDE ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Mises en garde spéciales:

Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations cutanées.

Ce médicament contient du hydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Précautions d'emploi:

Une augmentation des quantités appliquées n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit mais pourrait

provoquer rougeur, desquamation et inconfort.

Si une réaction de type réaction d'hypersensibilité ou une irritation sévère apparaissent, l'utilisation du gel devra être interrompue provisoirement voire définitivement.

En cas d'application accidentelle sur les muqueuses (yeux, bouche, narines) ou sur les plaies ouvertes, rincer soigneusement à l'eau tiède.

Du fait, du caractère légèrement irritant du gel, l'usage concomitant de produits cosmétiques nettoyants astringents et d'agents desséchants ou irritants (tels que produits parfumés ou alcoolisés) est à éviter.

Le gel d'adapalène appliqué le soir peut être également utilisé avec d'autres traitements antiacnéiques appliqués le matin, par exemple, des lotions à l'érythromycine (4 %) ou à la clindamycine (1 %) ou des gels aqueux au peroxyde de benzoyle à des concentrations allant jusqu'à 10 %.

L'exposition au soleil et aux lampes à ultraviolet provoque une irritation supplémentaire. Eviter en conséquence une exposition pendant le traitement dans toute la mesure du possible.

Le traitement pourra cependant être poursuivi si l'exposition solaire est réduite au minimum (protection par le port d'un chapeau et l'utilisation d'une crème écran solaire) et le rythme des applications ajusté.

En cas d'exposition exceptionnelle au soleil (une journée à la mer par exemple), ne pas appliquer la veille, le jour même et le lendemain.

Une exposition préalable a entraîné des brûlures ("coup de soleil"), attendre un complet rétablissement avant d'entreprendre le traitement.

Interactions médicamenteuses :

L'utilisation de l'adapalène avec d'autres médicaments topiques antiacnéiques, comme par exemple le phosphate de clindamycine ou le peroxyde de benzoyle, ne produit pas de dégradation mutuelle.

L'adapalène étant faiblement absorbé par la peau, l'interaction avec des médicaments administrés par voie systémique est donc peu probable.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

L'usage de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

Allaitement :

Ne pas appliquer sur la poitrine pendant l'allaitement.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Une irritation réversible de la peau peut apparaître, disparaissant lorsque le traitement est interrompu ou les applications espacées. Une sensation de chaleur ou un léger picotement peut se produire après application.

SURDOSAGE :

Malgré le faible risque de d'ingestion accidentelle, il faut envisager la possibilité d'un lavage gastrique.

Conditions de conservation:

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C